卫生部

国家卫生监测机构

董事会

规范性教学——第106期，2021年11月11日

制定低风险药品名单，待通知。

技术数据表

国家卫生监测机构董事会，行使根据1999年1月26日第9,782号法律第7、3、4条，以及由大学委员会决议（RDC No. 255）批准的内部条例第53、7、7条第1、3款，行使赋予其的权力，2018年12月10日的会议于2021年11月10日举行，决议如下：

第1条 本规范性指令确立了低风险药品清单，须依据2021年11月11日大学董事会决议——RDC第576号或其更新所附通知。

第2条 本规范性指令自2021年12月1日起生效。

安东尼奥·巴拉·托雷斯
首席执行官

附属

需通报的低风险药物清单

1.

产品	硼酸溶液 3%
活性成分的浓度	30 mg/mL
同义词	硼水
药品形式	解决方案
适应症	抗菌、舒缓，且在渗出性皮炎中略带收敛作用。
如何使用	成人使用。 外部使用。 每天在受影响区域涂抹两到三次，配合纱布或棉布敷布。
警告	任何类型的伤害、伤口或烧伤，都不要针对身体的大面积使用。不适合儿童使用。不要摄入。
生产线	液体

2.

产品	叶酸
活性成分的浓度	0.2 mg/mL
同义词	维生素B9
药品形式	解决方案
适应症	治疗叶酸缺乏及减少胎儿畸形发生。
剂量	成虫用途 减少胎儿畸形发生： 加2毫升。 叶酸缺乏的治疗：
	每天最多服用5毫升。 注意：如适用，请根据产品特性告知剂量的滴剂等效性。
警告	禁忌症：对叶酸过敏的患者。液体制剂中叶酸的存在会增加膳食铁的吸收，而对于组织中该元素积累的地中海贫血患者来说，叶酸可能有害。因此，该药物不应在饭前或饭后立即使用。 服用苯妥英钠治疗的癫痫患者，过高剂量的叶酸可能会引发癫痫发作。
	超过0.1毫克/天的叶酸剂量可能掩盖恶性贫血病例，因为血液学特征恢复正常，而神经损伤则在进行。
生产线	液体

3.

产品	水杨酸软膏 10%
活性成分的浓度	水杨酸 100 mg/g
同义词	水杨酸凡士林 10%
药品形式	软膏
适应症	治疗鸡眼和疣。
如何使用	外部使用。 晚上涂抹受影响部位，早晨取下。 它具有强烈的角质溶解特性（去除皮肤的最外层），使用时应格外小心，建议使用刮刀或防护手套。
警告	禁忌症：孕期和哺乳期对水杨酸过敏的患者。糖尿病患者应谨慎使用。 避免接触眼睛、面部、生殖器和黏膜。 涂抹后要洗手。 不良反应：长期使用可能导致吸收和醉酒，表现为恶心、呕吐和眩晕。
生产线	半固态

4.

产品	水杨酸软膏 20%
活性成分的浓度	水杨酸 200 mg/g
同义词	水杨酸凡士林 20%
药品形式	软膏
适应症	治疗角化过度，如黑头、脚裂、干玉米和疣。
如何使用	外部使用。 对于脚部裂纹，应每天涂抹两次受影响区域;对于干燥的老茧和疣，晚上涂抹并用胶带覆盖，第二天取下。 它具有强烈的角质溶解特性（去除皮肤的最外层），使用时应格外小心，建议使用刮刀或防护手套。
警告	禁忌症：孕期和哺乳期对水杨酸过敏的患者。糖尿病患者应谨慎使用。 避免接触眼睛、面部、生殖器和黏膜。 涂抹后要洗手。 药物相互作用：磨蚀性肥皂、祛痘制剂、含酒精制剂、化妆品或具有强烈干燥效果的肥皂
	它们会引起累积的刺激或干燥效果，导致皮肤过度刺激。 不良反应：长期使用可能导致吸收和醉酒，表现为恶心、呕吐和眩晕。
生产线	半固态

5.

产品	净水
同义词	蒸馏水、去离子水、逆渗透水、超滤水。 注意：应根据获取过程使用"纯净水"的同义词。
药品形式	液体
适应症	伤口清洗
如何使用	外部用途 直接涂抹在受影响部位。
警告	不应用于稀释和药物应用。 由于水中缺乏离子，误食可能导致腹泻。
生产线	无菌液体或液体

6.

产品	樟颜醇
活性成分的浓度	樟脑100 mg/mL（10%）乙醇，96° GL
同义词	樟脑醇溶液
药品形式	解决方案
适应症	肌肉和关节疼痛的有症状治疗。瘙痒（瘙痒）的症状缓解。
如何使用	外部使用。 每天用纱布或棉花直接涂抹在已清洁的受影响区域三到四次，利用摩擦力。
警告	不适用于两岁以下儿童。 远离热源。 注意：公众销售的最大包装容量为50毫升。产品需要初级琥珀玻璃包装。补充NBR 5991/97和2002年2月20日RDC 46或其更新中的警告。
生产线	液体

7. *（文本来源于规范性指令265/2023）*

以往草稿

产品	乙醇
活性成分的浓度	乙醇96° GL 75.73克纯化水，qsp 100克（70% - w/w）或81.3毫升纯化水qsp 100 mL（77% - v/v）
同义词	酒精 70%
药品形式	解决方案
适应症	防腐剂
如何使用	外部使用。 直接涂抹在受影响部位，之前清理过， 借助棉花或纱布。
警告	远离热源。 注意：公众销售的最大包装容量为50毫升。 再加上NBR 5991/1997和RDC No. 691/2022中的警告，或其更新内容。
生产线	液体

8. *（文本来源于规范性指令265/2023）*

以往草稿

产品	乙醇 70%
活性成分的浓度	乙醇 96° GL 75.73 克/100克（70% 含水/水）
同义词	洗手液
药品形式	过来这里
适应症	洗手液
如何使用	外部使用。直接涂抹在之前清洁过的手上。
警告	远离热源。 注意：补充NBR 5991/1997和RDC No. 691/2022或其更新中包含的警告。
生产线	半固态

9.

产品	10%氨溶液
活性成分的浓度	氢氧化铵 0.1 mL/mL
同义词	稀释氨
药品形式	解决方案
适应症	虫咬引起的止痛。
如何使用	外部使用。 申请咬伤部位。不要遮住那个地方。
警告	避免与眼睛接触。不要吸气。接触皮肤和眼睛会产生水疱和水疱。 在通风良好的地方握持，不要摇晃。如果被吞咽，请及时寻求医疗帮助。如果发生事故，要用大量水清洗。使用前，在皮肤上测试少量以检测敏感度。请勿重复使用包装。
生产线	液体

10.

产品	亚甲蓝溶液 1%
活性成分的浓度	亚甲蓝 10 mg/mL
同义词	甲基响氯化物
药品形式	解决方案
适应症	防腐剂
如何使用	外部使用。 用纱布或棉花涂抹在该部位。
警告	该产品可能会染色皮肤。在这种情况下，可以使用次氯酸钠溶液来进行漂白。
生产线	液体

11.

产品	苯甲酰胺溶液 20%
活性成分的浓度	苯甲香200 mg/mL（w/v）应含有至少4%（w/w）总酸，以苯甲酸形式表达
同义词	本乔姆酊剂，苏门答腊，安息香
药品形式	解决方案
适应症	防腐剂
如何使用	外部使用。 用纱布或棉花涂抹在该部位。
警告	可能出现过敏反应和接触性皮炎。
生产线	液体

12.

产品	苯甲酸盐乳液 100 mg/mL
活性成分的浓度	100 mg/mL
同义词	苯甲酸苯甲基酯
药品形式	乳液（化妆水）
适应症	治疗根瘤（虱子和虱子）和疥疮（疥疮）。
如何使用	外部使用。 使用前摇匀。建议在使用产品前对小面积进行触摸测试。如果出现灼烧或发红，应避免使用该产品。 儿童用法。 牙根治疗：洗头后用毛巾擦去多余的水分。然后以足够的量施用该产品 通过按摩该区域来润湿头发和头皮。用毛巾包住头部，让它作用大约3分钟。死虱和虱子应用细齿梳子清除。然后，洗头去除产品。如有必要，应再次申请。 疥疮治疗：应在洗澡后，最好在夜间涂抹（热水浴不可）。产品应涂抹在仍湿润的皮肤上，量足以覆盖颈部以下皮肤（注意疥疮最常见的部位：指缝间、腋下、腹部和臀部）。让它干燥后再涂抹，穿衣或躺下时不要擦拭身体。第二天早上，重新洗个澡，去除产品，换上身体和床上的衣服，床上应洗涤熨烫。如有必要，应在24小时后重复治疗。如果同一家庭中还有其他疥疮患者，应同时治疗以防止再次感染。最高使用限制是每天1个应用。
警告	禁忌症：对苯甲酸苄极为敏感的人。不要摄入。摄入会刺激中枢神经系统，表现为激动、眩晕、头痛、恶心、呕吐、腹泻、呼吸急促、发绀、过敏和皮肤发红、心悸和抽搐等临床表现。 不应用于面部、眼睛和黏膜，或皮肤上有伤口、病变或烧伤的地方。如果发生这种情况，请用大量水冲洗。 对于已经对其他皮肤产品过敏的人，使用该产品时应谨慎使用。 它可能在施药部位引起轻微刺激、荨麻疹、接触性皮炎或尿布疹。在疥疮治疗期间，施药部位也可能出现红斑性皮疹。 它可能刺激皮肤和黏膜，不建议使用其他对皮肤有刺激性或有害作用的物质（如水杨酸、氢醌等），因为可能会加剧有害影响。 孕妇和婴儿未经医疗建议不得使用。
生产线	液体

13.

产品	苯甲酸盐乳剂 250 mg/mL
活性成分的浓度	250 mg/mL
同义词	苯甲酸苯甲基酯
药品形式	乳液（化妆水）
适应症	虱子和虱子的治疗和疥疮（疥疮）
如何使用	外部使用。 使用前摇匀。建议在使用产品前对小面积进行触摸测试。如果出现灼烧或发红，应避免使用该产品。 成人和儿童使用。2岁以下儿童：将1份产品稀释至3份水中。2岁以上儿童：将1份产品稀释到2份水中。成虫：不要稀释。老年人：将1份产品稀释到2份水中。 牙根治疗：洗头后用毛巾擦去多余的水分。然后涂抹足够的产品，使头发和头皮湿润，同时按摩该区域。用毛巾包住头部，让它作用大约3分钟。虱子 死去和虱子必须用细细的牙齿梳子去除。然后，洗头去除产品。如有必要，应重复申请。成人如有需要，连续再涂抹两天。 疥疮治疗：应在洗澡后涂抹，最好在夜间使用（热水浴不可）。产品应涂抹在仍湿润的皮肤上，量足够覆盖颈部以下皮肤（观察疥疮最常见的部位：指缝、腋下、腹部和臀部）。晾干后重新涂抹，穿衣或躺下时不擦干身体。第二天早上，重新洗澡去除产品，换上身体和床上的衣物，之后应清洗和熨烫。 如有必要，应在24小时后重复治疗。成年人如有需要，连续最多连续5晚重复使用该产品。如果同一屋檐下有其他疥疮患者，应同时治疗，以避免再次感染。最高使用限额为每天一次。
警告	对苯甲酸苄极敏感者禁用。勿摄入。摄入可能刺激中枢神经系统，表现为激动、眩晕、头痛、恶心、呕吐、腹泻、呼吸急促、发绀、过敏及皮肤发红、心悸和抽搐。 不应用于面部、眼睛和黏膜，或皮肤上有伤口、病变或烧伤的地方。如果发生这种情况，请用大量水冲洗。 对于已经对其他皮肤产品过敏的人，使用该产品时应谨慎使用。 它可能在施药部位引起轻微刺激、荨麻疹、接触性皮炎或尿布疹。在疥疮治疗期间，施药部位也可能出现红斑性皮疹。 它可能刺激皮肤和黏膜，不建议使用其他对皮肤有刺激性或有害作用的物质（如水杨酸、氢醌等），因为可能会加剧有害影响。 孕妇和婴儿未经医疗建议不得使用。
生产线	液体

14.

产品	苯甲酸苄肥皂
活性成分的浓度	100毫克/克
同义词	苯甲酸苯甲基酯
药品形式	肥皂
适应症	治疗根瘤（虱子和虱子）和疥疮（疥疮）。
如何使用	外部使用。 建议在使用前对小区域进行触摸测试。如果出现灼烧或发红，不应使用该产品。 根瘤治疗：应用肥皂清洗受影响区域，产生泡沫，泡沫应保持5分钟。用细齿梳清除虱子和虱卵。如有需要，应重复涂抹。 疥疮治疗：应用肥皂仔细清洗患病部位，产生泡沫，直到皮肤干燥。如果同一屋檐下有其他疥疮患者，应同时治疗以避免再次感染。每日最多一次使用。
警告	对苯甲酸苄极敏感者禁用。勿摄入。摄入可能刺激中枢神经系统，表现为激动、眩晕、头痛、恶心、呕吐、腹泻、呼吸急促、发绀、过敏及皮肤发红、心悸和抽搐。 不应用于面部、眼睛和黏膜，或皮肤上有伤口、病变或烧伤的地方。如果发生这种情况，请用大量水冲洗。 对于已经对其他皮肤产品过敏的人，使用该产品时应谨慎使用。 它可能在施药部位引起轻微刺激、荨麻疹、接触性皮炎或尿布疹。在疥疮治疗期间，施药部位也可能出现红斑性皮疹。 它可能刺激皮肤和黏膜，不建议使用其他对皮肤有刺激性或有害作用的物质（如水杨酸、氢醌等），因为可能会加剧有害影响。 孕妇和婴儿未经医疗建议不得使用。
生产线	实心

15.

产品	小苏打
活性成分的浓度	最低99%（含水）小苏打
同义词	维克盐
药品形式	火药
适应症	制酸剂
剂量	将2.5克（1茶匙）溶解在一杯过滤水中，餐前服用30分钟以抵消胃中过多的胃分泌物。
警告	成人使用。 因可能发生碱性乳制综合征，请勿与富含牛奶和乳制品的饮食联合使用。 不良反应：胃酸反弹效应（症状加重）可能因胃泌素刺激而出现。长期使用（超过2周）需要医疗监测。 它会干扰药物的吸收，因此应在使用其他药物前后2小时服用。
生产线	实心

16.

产品	小苏打 + 柠檬酸 + 酒石酸
活性成分的浓度	碳酸氢钠 2.485 克 + 柠檬酸 1.9485 克 + 酒石酸 0.2165 克
药品形式	起泡粉
适应症	缓解与胃灼热相关的症状（胃酸和灼烧感）和消化不良。
剂量	用途：成人及儿童（12岁以上） 每4小时或医生指示，将一剂溶解在半杯水中。24小时内不要超过4次剂量的上限。 成人使用（60年以上） 每4小时或医生指示，将一剂溶解在半杯水中。24小时内不要超过3次剂量的限额。 注意：如果产品未单独销售，必须提供剂量辅助工具。
警告	禁忌症：对柠檬酸、酒石酸、碳酸氢钠或任何赋形剂过敏;代谢性或呼吸性碱中毒、低盐水、低钙血症或低氯血症患者;胃和肝脏问题患者;腹部FORA、恶心或呕吐的患者。孕期不推荐使用该产品。 如果症状持续或加重，或产品需要超过14天，请咨询医生。避免在胃部食物和/或饮料过多时使用。 药物相互作用：小苏打可能改变肾脏对其他药物的吸收和清除。建议在服用其他药物后两小时内避免服用制酸剂。慢性肾病患者服用氢氧化铝作为磷酸结合剂，并服用含柠檬酸的起泡片剂补充钙，需谨慎。 不良反应：腹痛、和打嗝。
生产线	实心

17.

产品	碳酸钙
活性成分的浓度	最低碳酸钙含量为98%（水/水）
药品形式	火药
适应症	制酸剂
剂量	每天摄入1到2克，溶解在水中。
警告	成人使用。 禁忌症：肾结石患者、孕妇或哺乳期者应谨慎使用。高钙血症（血液中钙浓度高）的人不应使用该药物。 不良反应：味觉变化，胃酸反弹效应（症状加重），由胃泌素刺激引起。长期使用（超过2周）需要医疗监测。 药物相互作用：干扰药物吸收，因此应在使用其他药物前后2小时服用。
生产线	实心

18.

产品	碳酸钙
活性成分的浓度	500毫克 750毫克
药品形式	舱体 压缩 咀嚼片
适应症	制酸剂
剂量	每天服用2到4粒胶囊或片剂。
警告	成虫用途 禁忌症：肾结石患者、孕妇或哺乳期者应谨慎使用。高钙血症（血液中钙浓度高）的人不应使用该药物。 不良反应：味觉变化，胃酸反弹效应（症状加重），由胃泌素刺激引起。长期使用（超过2周）需要医疗监测。 药物相互作用：干扰药物吸收，因此应在使用其他药物前后2小时服用。
生产线	实心

19.

产品	碳酸钙+胆钙醇
活性成分的浓度	1250毫克碳酸钙（相当于500毫克元素钙）+ 200 IU胆石化醇
同义词	碳酸钙+维生素D3
药品形式	压缩 涂层平板
适应症	预防佝偻病及绝经前后骨质脱矿的预防或辅助治疗
剂量	成人使用。 每天口服1到3片。饭后食用。 儿童用法。 每天饭后服用一片。
警告	禁忌症：高钙血症（血液中钙过多）、维生素D过多（维生素D过多）、对胆石化醇、麦角钙化醇或维生素D代谢物的过敏反应。 不良反应：脂质变化、维生素D过高、胃肠不适、心动过缓和心律失常。 过量：食欲不振、疲劳、恶心呕吐、腹泻、体重减轻、多尿（尿量增加）、出汗、头痛、口渴、眩晕，以及血浆和尿液中钙和磷浓度升高、肾衰竭、软组织钙化和肾结石。
生产线	实心

20.

产品	碳酸钙+胆钙醇
活性成分的浓度	1250毫克碳酸钙（相当于500毫克元素钙）+ 400 IU胆钙化醇
同义词	碳酸钙+维生素D3
药品形式	压缩 涂层平板
适应症	预防佝偻病及绝经前后骨质脱矿的预防或辅助治疗
剂量	成人使用。 每天口服1到2片。饭后食用。 儿童用法。 每天饭后服用一片。
警告	禁忌症：高钙血症（血液中钙过多）、维生素D过多（维生素D过多）、对胆石化醇、麦角钙化醇或维生素D代谢物的过敏反应。 不良反应：脂质变化、维生素D过高、胃肠不适、心动过缓和心律失常。 过量：食欲不振、疲劳、恶心和呕吐、腹泻、体重减轻、尿多样（尿量增加）、出汗、头痛、口渴、眩晕，以及血浆和尿液中钙和磷浓度升高、肾衰竭、软组织钙化和肾结石。
生产线	实心

21.

产品	活性炭
同义词	活性炭
药品形式	压缩 舱体
适应症	减少肠道气体积累。
剂量	饭前至少30分钟摄入1克，饭后最多1克。
警告	禁忌症：怀孕期间及肠梗阻和胃肠道解剖变化病例。儿童使用时应谨慎，活性炭可能干扰营养吸收。不建议12岁以下儿童使用。不建议长期使用活性炭。 药物相互作用：该产品可能与其他药物发生相互作用，因此应在其他药物服用前至少两小时或后一小时服用。 不良反应：便秘、电解质失衡、胃肠梗阻、低血压（血压降低）、呕吐或腹泻。
生产线	实心

22.

产品	酮康唑
活性成分的浓度	20毫克/克
药品形式	奶油
适应症	适用于表面真菌的局部治疗，包括皮藻菌（如体癣、十字梭癣、手癣和足癣）、皮肤念珠菌病和五色癣。
如何使用	外部使用。 不仅应涂抹在感染部位，也应涂抹在其周围。涂抹后请彻底洗手。应每天涂抹一次于感染部位。症状和病变消失后，应继续治疗几天。治疗4周后效果良好，具体取决于菌丝病的类型、病变的范围和强度。
警告	该药不应用于结膜，且不适用于眼部感染。若与外用皮质类固醇联合使用，为防止长期治疗突然中断后反弹，建议早晨继续使用效力较低的皮质类固醇，晚上涂抹酮康唑乳膏，随后在2至3周后逐步停用外用皮质类固醇治疗。应采取一般卫生措施，以帮助控制污染或再感染因素。涂抹药膏前后彻底洗手。个人衣物和毛巾分开使用，避免家人被污染。定期更换接触感染皮肤的衣物，以避免再次感染。
生产线	半固态

23.

产品	酮康唑
活性成分的浓度	20毫克/克
药品形式	洗发水
适应症	适用于治疗成人头皮脂溢性皮炎。
如何使用	成人使用。 外部使用。 治疗脂溢性皮炎时，应每周使用两次氯康唑洗发水，持续2-4周。对于脂溢性皮炎的预防性治疗，氯康唑洗发水应每周使用一次或每两周一次。用氯康唑洗发水清洗受影响部位，保持洗发水，作用3-5分钟后冲洗干净。
警告	对于长期接受局部皮质类固醇治疗的患者，建议在使用酮康唑洗发水期间，在2至3周内逐步暂停类固醇治疗，以避免潜在的反跳效应。避免与眼睛接触。如果出现这种情况，用水冲洗眼睛。
生产线	液体

24.

产品	氯化镁
活性成分的浓度	33克氯化镁
药品形式	火药
适应症	轻度泻药
如何使用	将包装内容物溶解在1升过滤水中;将该溶液储存在玻璃容器中，放入冰箱，每天服用60毫升（一杯茶），最好在早晨空腹时饮用。它可以与柑橘汁混合，以掩盖溶液的苦味。当排便频率增加时，减少剂量。如果出现腹泻，请停止使用。 注意：以下警示短语必须显著显示在包装和包装说明书上（如有）。"开封后，将产品密封保存在冰箱中"以及"稀释后，药物应在X天内服用"。（将X替换为稀释后稳定性研究中证明的天数。）
警告	禁忌症：严重肾功能不全患者及孕妇禁用氯化镁，因为镁会穿过胎盘，可能干扰胎儿血清水平。 当肾功能受损时，应配合特殊护理和血清水平监测镁替代。
生产线	实心

25. ***（被规范性指令265/2023撤销）***

以往草稿

26.

产品	乳酸盐化胶棉 20%
活性成分的浓度	水杨酸2克/10毫升，乳酸1.5毫升/10毫升
药品形式	解决方案
适应症	鸡眼和疣的治疗
如何使用	外部使用。 保护病变周围区域，每天涂抹四层胶棉，等待每层干燥后再重新涂抹，直到疣或茧被消除。
警告	不要在眼睛附近使用。避免接触黏膜和完整的皮肤。 糖尿病患者及手臂和腿部循环系统问题患者禁用该药。
生产线	液体

27.

产品	水杨化胶棉 12%
活性成分的浓度	水杨酸 120 mg/mL
药品形式	解决方案
适应症	治疗鸡眼和疣。
如何使用	外部使用。 保护病变周围区域，每天涂抹四层胶棉，等待每层干燥后再重新涂抹，直到疣或茧被消除。
警告	不要在眼睛附近使用。避免接触黏膜和完整的皮肤。 糖尿病患者及手臂和腿部循环系统问题患者禁用该药。
生产线	液体

28.

产品	硫磺奶油 10%
活性成分的浓度	硫 0.1 克/克
药品形式	奶油
适应症	疥疮和痤疮。
如何使用	外部使用。 每天涂抹一到两次受影响区域。
警告	将硫磺涂抹在皮肤上可能会引起刺激。避免接触眼睛、口腔及其他黏膜。 禁忌症：对硫过敏。 不良反应：皮肤刺激、发红或皮肤鳞屑。
生产线	半固态

29.

产品	梅尔·罗泽
活性成分的浓度	蜂蜜中含有10%红玫瑰提取物，相当于1.5-3%单宁
同义词	红玫瑰的流体提取物
药品形式	解决方案
适应症	收敛剂用于口炎，尤其是婴儿期（念珠菌感染）
如何使用	根据年龄，使用柔性棉棒、安抚奶嘴或漱口，涂抹纯净或稀释的水。
警告	禁忌症：过敏患者。 不要摄入。
生产线	液体

30.

产品	葡萄糖酸氯己定 0.5%
活性成分的浓度	0.005 mL/mL
同义词	氯己定二氯聚酸盐
药品形式	水溶液
适应症	防腐剂
如何使用	外部使用。 涂抹产品量足以湿润整个区域，并用无菌纱布擦拭。让其完全干燥，如有必要，重复此过程。它可以用于黏膜。
警告	避免与眼睛、耳朵和嘴巴接触。如果这些部位被污染，请用水彻底冲洗。 有氯己定过敏史者禁用。
生产线	液体

31.

产品	葡萄糖酸氯己定 0.5%
活性成分的浓度	0.005 mL/mL
同义词	氯己定二氯聚酸盐
药品形式	酒精溶液
适应症	消毒剂。对于侵入性手术前的皮肤消毒（如导管插入）以及手术后进行现场消毒;用于包扎血管导管插入部位。
如何使用	外部使用。 涂抹并涂抹至足够湿润整个待处理区域。让其完全干燥，如有必要，重复此过程。 等产品完全干透后再穿刺或插入皮肤。 手术中的皮肤防毒应先使用氯己定溶液加表面活性剂进行。
警告	避免与眼睛、耳朵和嘴巴接触。如果这些部位被污染，请用水彻底冲洗。不应用于体腔冲洗、手术伤口敷料或皮肤和黏膜病变。不要涂抹在黏膜上。 有氯己定过敏史者禁用。
生产线	液体

32.

产品	氯己定葡萄糖酸盐 1.0%
活性成分的浓度	0.01 mL/mL
同义词	氯己定二氯聚酸盐
药品形式	水溶液
适应症	防腐剂
如何使用	外部使用。 涂抹产品量足以湿润整个待处理区域，并用无菌纱布擦拭。让它完全干燥，如有必要，重复同样的步骤。它可以用于黏膜。
ADVERTÊNCIA	Evitar contato com olhos, ouvidos e boca. Para os casos de contaminação destas partes, lavar abundantemente com água. Contraindicado para pessoas com história de hipersensibilidade à clorexidina.
LINHA DE PRODUÇÃO	Líquido

33.

PRODUTO	Gliconato de clorexidina 1,0%
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	0.01 mL/mL
SINÔNIMOS	Digliconato de clorexidina
FORMA FARMACÊUTICA	Solução alcoólica
INDICAÇÃO	Antisséptico para desinfecção das mãos antes de contato com pacientes e preparo cirúrgico das mãos.
如何使用	Uso externo. 对于手部消毒，应遵循Anvisa推荐的含酒精制剂（抗菌擦拭）手部卫生方法。
警告	避免与眼睛、耳朵和嘴巴接触。如果这些部位被污染，请用水彻底冲洗。有氯己定过敏史者禁用。 不要涂抹在黏膜上。不要与除菌皂一起使用。
生产线	液体

34.

产品	氯己定葡萄糖酸盐 2.0%
活性成分的浓度	0.02 mL/mL
同义词	氯己定二氯聚酸盐
药品形式	界面活性剂溶液
适应症	防腐剂;患者皮肤的去胚芽，在侵入性手术（如手术、中心静脉导管等）前进行;术前对患者进行洗澡;在进行侵入性手术前，以及在照顾被多重耐药病原体定殖或感染的患者后，对医护人员的双手进行准备。
如何使用	外部使用。 对于手部消毒，请遵循Anvisa推荐的术前准备技术。 手术部位的消毒：湿润皮肤后轻轻涂抹产品。用无菌敷布冲洗并擦干该区域。 术前浸泡：润湿身体并涂抹产品。用手或海绵轻轻揉搓，直到产生泡沫。冲洗后擦干。
警告	避免与眼睛、耳朵和嘴巴接触。如果这些部位被污染，请用水彻底冲洗。不要用作敷料。不要涂抹在黏膜上。 有氯己定过敏史者禁用。
生产线	液体

35.

产品	氯己定葡萄糖酸盐 2.0%
活性成分的浓度	0.02 mL/mL
同义词	氯己定二氯聚酸盐
药品形式	水溶液
适应症	消毒剂。手术前黏膜准备、尿导管前生殖区域准备、牙科手术中的口外抗菌。
如何使用	外部使用。 涂抹产品量足以湿润整个待处理区域，并用无菌纱布擦拭。 让其完全干燥，如有必要，重复此过程。它可以用于黏膜。
警告	避免与眼睛、耳朵和嘴巴接触。如果这些部位被污染，请用水彻底冲洗。 不应用于体腔灌洗。手术患者皮肤准备时，请勿使用。请勿用于手部的去菌/消毒。请勿用于手术伤口或皮肤和黏膜病变的包扎。 有氯己定过敏史者禁用。
生产线	液体

36.

产品	氯己定葡萄糖酸盐 2.0%
活性成分的浓度	0.02 mL/mL
同义词	氯己定二氯聚酸盐
药品形式	酒精溶液
适应症	消毒剂。手术场的消毒;侵入性手术前进行皮肤消毒。中心和外周血管导管插入处的消毒。
如何使用	外部使用。 涂抹并涂抹至足够湿润整个待处理区域。让其干燥，必要时重复此程序。等产品完全干透后再穿刺或插入皮肤。
警告	避免与眼睛、耳朵和嘴巴接触。如果这些部位被污染，请用水彻底冲洗。 不应用于体腔灌洗。请勿用于手术伤口或皮肤和黏膜病变的包扎。 有氯己定过敏史者禁用。
生产线	液体

37.

产品	葡萄糖酸氯己定 4.0%
活性成分的浓度	0.04 mL/mL
同义词	氯己定二氯聚酸盐
药品形式	界面活性剂溶液
适应症	防腐剂;患者皮肤在侵入性手术前进行去胚（如手术、中心静脉导管）;术前对患者进行洗澡;在进行侵入性手术前，以及在治疗被多重耐药病原体定殖或感染的患者后，以及在疫情爆发情况下，对医护人员的双手进行准备。
如何使用	外部使用。 对于手部消毒，请遵循Anvisa推荐的术前准备技术。手术部位的消毒：湿润皮肤后轻轻涂抹产品。用无菌敷布冲洗并擦干该区域。 术前浸泡：润湿身体并涂抹产品。用手或海绵轻轻揉搓，直到产生泡沫。冲洗后擦干。
警告	避免与眼睛、耳朵和嘴巴接触。如果这些部位被污染，请用水彻底冲洗。不要用作敷料。不要涂抹在黏膜上。 有氯己定过敏史者禁用。
生产线	液体

38.

产品	氢氧化铝悬浮液 6%
活性成分的浓度	60 mg/mL
药品形式	悬挂
适应症	胃酸，辅助治疗胃和十二指肠溃疡及反流食管炎。
剂量	每天四次服用5到10毫升，每次，饭前15分钟和睡前服用，或由医生决定。
警告	使用前摇匀。 它可能引起便秘（便秘）。 肾病患者应谨慎使用。它可能干扰药物吸收，因此应在使用其他药物前后2小时服用。
生产线	液体

39.

产品	氢氧化镁悬浮液 8%
活性成分的浓度	80 mg/mL
同义词	镁乳;镁岩浆;水合镁;水合氧化镁
药品形式	悬挂
适应症	抗酸药，轻度泻药。
剂量	成人使用。 抗酸剂：每天2到3次，5至15毫升（1茶匙对1汤匙）。 泻药：30毫升至60毫升（2至4汤匙）。 儿童用法。 根据年龄，将剂量减少到成人推荐剂量的四分之一到一半。
警告	使用前摇匀。 注意事项：怀孕期间或哺乳期间未经医生建议不得摄入。如发生过量，应寻求医疗建议。 作为泻药使用注意事项：在腹痛、恶心、呕吐、排便习惯改变、直肠出血和肾脏疾病超过2周的情况下使用。 作为抗酸剂使用注意事项：可能有泻药作用。
生产线	液体

40.

产品	氢氧化镁4%和铝6%悬浮液
活性成分的浓度	氢氧化镁 40 mg/mL + 氢氧化铝 60 mg/mL
药品形式	悬挂
适应症	胃酸，辅助治疗胃和十二指肠溃疡及反流食管炎。
剂量	每天四次，每次5到10毫升，每次，饭前和睡前各15分钟服用，或由医生自行决定。
警告	使用前摇匀。 禁忌症：适用于对配方奶成分过敏、严重肾衰竭、低磷血症（血中磷过低）或肠梗阻的患者。孕期和哺乳期间不应使用。 注意事项：对正在接受血液透析的卟啉症患者应谨慎施药;在低磷饮食存在的情况下。 每日剂量不应超过，治疗时间不应延长超过14天（最高剂量）。 该药物可能降低其他药物的吸收。因此，应在使用其他药物前后2小时给予。 正常磷血症患者长期使用含铝制酸剂可能导致低磷血症。 对于肾功能障碍患者，该药物的使用应在医疗监督下进行。
生产线	液体

41.

产品	氢氧化镁铝
活性成分的浓度	氢氧化镁 200 mg + 氢氧化铝 200 mg
药品形式	咀嚼片
适应症	治疗胃酸、胃灼热、胃部不适、胃痛、消化不良、灼烧感、消化性食管炎（由胃反流引起的食管炎症）和食管裂孔疝等症状。
剂量	儿童使用（超过6年）。 根据年龄，每天服用1到2片，每次两次。 成人使用。 每天服用2到3片，每次4次。 不要超过推荐剂量。应在饭后半小时及睡前服用。
警告	服用注意事项：药片应咀嚼，而非整颗吞服。 禁忌症：适用于对配方奶成分过敏、严重肾衰竭、低磷血症（血中磷过低）或肠梗阻的患者。 孕期和哺乳期间不应使用。 注意事项：对正在接受血液透析的卟啉症患者应谨慎施药;在低磷饮食存在的情况下。 每日剂量不应超过，治疗时间不应延长超过14天（最高剂量）。 该药物可能降低其他药物的吸收。因此，应在使用其他药物前后2小时给予。 正常磷血症患者长期使用含铝制酸剂可能导致低磷血症。肾功能障碍患者应在医疗监督下服用该药。
生产线	实心

42.

产品	氢氧化镁铝
活性成分的浓度	氢氧化镁 400 mg + 氢氧化铝 400 mg
药品形式	咀嚼片
适应症	治疗胃酸、胃灼热、胃部不适、胃痛、消化不良、灼烧感、消化性食管炎（由胃反流引起的食管炎症）和食管裂孔疝等症状。
剂量	口服。 成人使用。 对症治疗：每天服用1到2片咀嚼片。 最大给药量：6片。 应在饭后半小时及睡前服用。
警告	服用注意事项：药片应咀嚼，而非整颗吞服。 禁忌症：适用于对配方奶成分过敏、严重肾衰竭、低磷血症（血中磷过低）或肠梗阻的患者。孕期和哺乳期间不应使用。 谨慎管理： - 接受血液透析的叶啉症患者;以及 - 在低磷饮食存在的情况下。 每日剂量不应超过，治疗时间不应延长超过14天（最高剂量）。 该药物可能降低其他药物的吸收。因此，应在使用其他药物前后2小时给予。 正常磷血症患者长期使用含铝制酸剂可能导致低磷血症。肾功能障碍患者应在医疗监督下服用该药。
生产线	实心

43.

产品	氢氧化铝 + 氢氧化镁 + 西甲硅油
活性成分的浓度	氢氧化铝 153 mg + 氢氧化镁 200 mg + 西甲硅油 25 mg
药品形式	咀嚼片
适应症	治疗胃酸、胃灼热、胃部不适、胃痛、消化不良、灼烧感、消化性食管炎（由胃反流引起的食管炎症）和食管裂孔疝等症状。它也被用作抗胀气剂（古董），包括术后病症。
剂量	成人使用。 每天服用2到4片，最多4次。 儿童使用。 每天服用1到2片。
警告	该药物不应用于对配方奶成分过敏、严重肾衰竭、低磷血症（血液中低磷）、怀孕、哺乳和肠道梗阻的情况。 该药物可能降低其他药物的吸收，因此应在使用其他药物前后2小时服用。 给药时应谨慎：对于正在接受血液透析的叶啉症患者;低磷饮食。不建议超过推荐剂量，或延长治疗超过14天（以最大剂量计）。正常磷血症患者长期使用含铝制酸剂可能导致低磷血症。对于肾功能障碍患者，该药物的使用应在医疗监督下进行。
生产线	实心

44.

产品	氢氧化铝、氢氧化镁和西甲硅油的悬浮液
活性成分的浓度	氢氧化铝 37 mg/mL + 氢氧化镁 40 mg/mL + 西甲硅油 5 mg/mL
药品形式	悬挂
适应症	治疗胃酸、胃灼热、胃部不适、胃痛、消化不良、灼烧感、消化性食管炎（由胃反流引起的食管炎症）和食管裂孔疝等症状。它还作为抗胀气药（古老药）用于缓解过多气体症状，包括术后症状。
剂量	儿童用法。 每天服用1茶匙（5毫升），每次1到2次。 成人使用。 每天服用1到2把甜点勺（10毫升到20毫升），每次4次。
警告	该药不应用于对配方奶成分过敏、严重肾衰竭、低磷血症（血液中低磷）、怀孕、哺乳和肠道梗阻的情况。严重肾衰竭患者禁用此药。 该药物可能降低其他药物的吸收。因此，应在使用其他药物前后2小时给予。 注意事项 给药应谨慎进行：在接受血液透析的叶啉症患者;在低磷饮食存在的情况下。 建议不要超过推荐剂量，也不要延长治疗超过14天（最高剂量）。正常磷血症患者长期使用含铝制酸剂可能导致低磷血症。 对于肾功能障碍患者，该药物的使用应在医疗监督下进行。
生产线	液体

45.

产品	次氯酸钠溶液
活性成分的浓度	100毫升中含有0.5克活性氯
同义词	达金的液体。达金消毒液。稀释次氯酸钠溶液
药品形式	解决方案
适应症	局部消毒药，用于伤口敷料。
如何使用	外部使用。 涂抹在受影响部位，无论是纯净还是用纱布或棉花稀释的水。
警告	不要摄入。不要吸气。避免接触眼睛和黏膜。
生产线	液体

46.

产品	次亚硫酸钠溶液40%
活性成分的浓度	400 mg/mL
同义词	硫代硫酸钠
药品形式	解决方案
适应症	治疗斑纹鞭虫病（海滩癣，白布）。
如何使用	外部使用。 成人和儿童使用。 每天在患病部位涂抹一次。
警告	不要摄入。
生产线	液体

47.

产品	碘化钾糖浆 2%
活性成分的浓度	20 mg/mL
药品形式	糖浆
适应症	是溶黏液和祛痰剂。
剂量	每天两次摄入15毫升（1汤匙），或由医生决定服用。
警告	限制：适用于孕妇、儿童及甲状腺疾病患者。糖尿病患者不得使用。
生产线	液体

48.

产品	**碘醇 0.1%**
活性成分的浓度	碘1 mg/mL，乙醇50%（v/v）
同义词	碘酒
药品形式	解决方案
适应症	防腐剂
如何使用	外部使用。 用于伤口清洁或敷料敷料。
警告	禁忌症：有碘化合物过敏史的人群禁忌。 注意事项和警告：不要用阻塞性组织覆盖施用部位。 不良反应：过敏通常表现为所患区域出现红斑性和囊泡性爆发（水疱）。不要摄入。
生产线	液体

49.

产品	**碘溶液 2%**
活性成分的浓度	碘20毫克/毫升
同义词	碘酊失效
药品形式	解决方案
适应症	防腐剂
如何使用	外部使用。 涂抹在伤口敷料上。
警告	禁忌症：有碘化合物过敏史的人群禁忌。 注意事项和警告：不要用阻塞性组织覆盖施用部位。该产品不应用于开放性伤口（可能导致碘吸收）及闭塞性敷料。 使用限制：新生儿和孕妇，因为可能导致碘中毒。避免长期使用。
生产线	液体

50.

产品	**碘溶液 5%**
活性成分的浓度	碘 50 mg/mL
同义词	碘强化滴剂
药品形式	解决方案
适应症	防腐剂
如何使用	外部使用。 涂抹在伤口敷料上。
警告	禁忌症：有碘化合物过敏史的人群禁忌。 注意事项和警告：不要用阻塞性组织覆盖施用部位。该产品不应用于开放性伤口（可能导致碘吸收）及闭塞性敷料。 使用限制：新生儿和孕妇，因为可能导致碘中毒。避免长期使用。
生产线	液体

51.

产品	**碘多多维酮 10%**
活性成分的浓度	100 mg/mL，相当于1%活性碘
药品形式	水溶液
适应症	防腐剂
如何使用	外部使用。 请根据医疗判断申请受影响区域。
警告	该产品不应用于碘过敏、开放性伤口（可能导致碘吸收）和封闭敷料的情况。 使用限制：新生儿和孕妇，因为可能导致碘中毒。避免长期使用。 如果误食，应多喝牛奶或用水打发的蛋白。
生产线	液体

52.

产品	**碘多多维酮 10%**
活性成分的浓度	100 mg/mL，相当于1%活性碘
药品形式	水醇溶液
适应症	抗菌剂在手术区划定及患者和手术团队的术前皮肤准备中被指示。
MODO DE USAR	外部使用。 Espalhar na pele e deixar agir por 2 minutos. Se necessário, repetir a operação.
ADVERTÊNCIA	O produto não deve ser usado em casos de alergia ao iodo, feridas abertas (pode resultar em absorção do iodo) e em curativos oclusivos. Restrição de uso: neonatos e gestantes, pois pode causar intoxicação pelo iodo. Evitar uso prolongado. Se ingerido, beber grande quantidade de leite ou claras de ovos batidas em água. Em contato com os olhos, lavá-los com água corrente. Em qualquer um dos casos procure orientação médica.
LINHA DE PRODUÇÃO	Líquido

53.

PRODUTO	**Iodopolividona 10%**
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	100 mg/mL, que equivale a 1% iodo ativo
SINÔNIMOS	Iodopolividona
FORMA FARMACÊUTICA	Solução com tensoativos
INDICAÇÃO	Antisséptico indicado na degermação das mãos e braços da equipe cirúrgica e na preparação pré-operatória da pele de pacientes.
MODO DE USAR	Uso externo. Espalhar na pele e deixar agir por 2 minutos. Enxaguar com água corrente e repetir a aplicação, se necessário, secando a pele com gaze ou toalha esterilizada.
ADVERTÊNCIA	O produto não deve ser usado em casos de alergia ao iodo, feridas abertas (pode resultar em absorção do iodo) e em curativos oclusivos. Restrição de uso: neonatos e gestantes, pois pode causar intoxicação pelo iodo. Evitar uso prolongado. Se ingerido, beber grande quantidade de leite ou claras de ovos batidas em água. Em contato com os olhos, lavá-los com água corrente. Em qualquer um dos casos procure orientação médica.
LINHA DE PRODUÇÃO	Líquido

54.

PRODUTO	Nitrato de miconazol
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	20 mg/g
FORMA FARMACÊUTICA	Creme vaginal
INDICAÇÃO	Indicado para o tratamento de infecções na região vaginal produzidas por fungos.
MODO DE USO	Uso externo (Vaginal) Uso adulto. Usar 5 gramas uma vez ao dia, ao se deitar, por 14 dias consecutivos. (Orientar sobre a forma correta de uso considerando as especificidades dos acondicionamentos e acessórios dosadores).
ADVERTÊNCIA	Não usar em caso de sensibilidade (alergia) ao nitrato de miconazol ou demais componentes da fórmula. Não ingerir. Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não compartilhar roupas ou acessórios de modo a evitar a transmissão da infecção. O parceiro sexual também deve ser tratado. Evitar contato entre o preservativo (camisinha) ou o diafragma de borracha (dispositivo de barreira inserido na vagina) e este medicamento, pois a formulação pode danificar o material e, neste caso, gravidez e doenças sexualmente transmissíveis podem não ser evitadas. Se estiver usando anticoagulante oral (medicamentos que agem sobre a coagulação do sangue), como a varfarina, consulte um médico antes de usar o produto. Consulte seu médico antes de usar miconazol se você estiver tomando outros medicamentos. Reações adversas: ligeira irritação local (vermelhidão), coceira e ardor após as primeiras aplicações, que tende a desaparecer com o decorrer do tratamento. Entretanto, se estes sintomas forem muito incômodos, persistentes ou se apresentar erupções cutâneas (feridas avermelhadas na pele) ou cólicas abdominais, interrompa o tratamento e informe o médico.
LINHA DE PRODUÇÃO	Semissólido

55.

PRODUTO	Nitrato de miconazol
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	20 mg/g
FORMA FARMACÊUTICA	Creme dermatológico
INDICAÇÃO	Indicado para o tratamento de*Tinea pedis*(pé de atleta),*Tinea cruris*(micose na região da virilha).*Tinea corporise* onicomicoses (micose nas unhas) causadas pelo*Trychophyton,EpidermophytoneMicrosporum*; candidiase cutânea (micose de pele),*Tinea versicolore* cromofitose.
MODO DE USO	Uso externo. Uso adulto e pediátrico. A aplicação do produto deve ser feita após lavagem e secagem do local. Aplicar diretamente sobre a região atingida duas vezes ao dia (manhã e noite). Espalhar por uma região um pouco maior do que a afetada. O tratamento deve ser ininterrupto e mantido até o completo desaparecimento das lesões. Contudo, caso não observe melhora após 4 semanas, procurar um profissional da saúde. Após o desaparecimento dos sinais e sintomas, o tratamento deve ser mantido por mais uma semana evitando recidivas. Se a área atingida não for as mãos, lave-as cuidadosamente após a aplicação.
ADVERTÊNCIA	Não usar em caso de sensibilidade (alergia) ao nitrato de miconazol ou demais componentes da fórmula. Usar com cuidado nas regiões próximas aos olhos, evitando contato direto. Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. É recomendável a troca frequente das roupas que ficam em contato com a área afetada evitando reinfecção. Se estiver usando anticoagulante oral (medicamentos que agem sobre a coagulação do sangue), como a varfarina, consulte um médico antes de usar o produto. Consulte seu médico antes de usar miconazol se você estiver tomando outros medicamentos. Reações adversas: ligeira irritação local (vermelhidão), coceira e ardor após as primeiras aplicações, que tende a desaparecer com o decorrer do tratamento. Entretanto, se estes sintomas forem muito incômodos, persistentes ou se apresentar erupções cutâneas (feridas avermelhadas na pele) interrompa o tratamento e informe o médico.
LINHA DE PRODUÇÃO	Semissólido

56.

PRODUTO	Nitrato de miconazol
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	20 mg/g
FORMA FARMACÊUTICA	Emulsão dermatológica
INDICAÇÃO	Indicado para o tratamento de*Tinea pedis*(pé de atleta),*Tinea cruris*(micose na região da virilha).*Tinea corporise* onicomicoses (micose nas unhas) causadas pelo*Trychophyton,EpidermophytoneMicrosporum*; candidíase cutânea (micose de pele),*Tinea versicolore* cromofitose.
MODO DE USO	Uso externo. Uso adulto e pediátrico. A aplicação do produto deve ser feita após lavagem e secagem do local. Aplicar diretamente sobre a região atingida duas vezes ao dia (manhã e noite). Espalhar por uma região um pouco maior do que a afetada. O tratamento deve ser ininterrupto e mantido até o completo desaparecimento das lesões. Contudo, caso não observe melhora após 4 semanas, procurar um profissional da saúde. Após o desaparecimento dos sinais e sintomas, o tratamento deve ser mantido por mais uma semana evitando recidivas. Se a área atingida não for as mãos, lave-as cuidadosamente após a aplicação.
ADVERTÊNCIA	Não usar em caso de sensibilidade (alergia) ao nitrato de miconazol ou demais componentes da fórmula. Usar com cuidado nas regiões próximas aos olhos, evitando contato direto. Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. É recomendável a troca frequente das roupas que ficam em contato com a área afetada evitando reinfecção. Se estiver usando anticoagulante oral (medicamentos que agem sobre a coagulação do sangue), como a varfarina, consulte um médico antes de usar o produto. Consulte seu médico antes de usar miconazol se você estiver tomando outros medicamentos. Reações adversas: ligeira irritação local (vermelhidão), coceira e ardor após as primeiras aplicações, que tende a desaparecer com o decorrer do tratamento. Entretanto, se estes sintomas forem muito incômodos, persistentes ou se apresentar erupções cutâneas (feridas avermelhadas na pele) interrompa o tratamento e informe o médico.
LINHA DE PRODUÇÃO	Líquido

57.

PRODUTO	Nitrato de miconazol
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	20 mg/g
FORMA FARMACÊUTICA	Suspensão aerossol Suspensão spray
INDICAÇÃO	Indicado para o tratamento de*Tinea pedis*(pé de atleta),*Tinea cruris*(micose na região da virilha), *Tinea corporis*(tíneas do corpo) e onicomicoses (micose nas unhas) causadas pelo*Trychophyton, EpidermophytoneMicrosporum*; candidíase cutânea (micose de pele),*Tinea versicolore* cromofitose.
MODO DE USO	Uso externo. Uso adulto e pediátrico. A aplicação do produto deve ser feita após lavagem e secagem do local. Aplicar diretamente sobre a região atingida duas vezes ao dia (manhã e noite). Espalhar por uma região um pouco maior do que a afetada. O tratamento deve ser ininterrupto e mantido até o completo desaparecimento das lesões. Contudo, caso não observe melhora após 4 semanas, procurar um profissional da saúde. Após o desaparecimento dos sinais e sintomas, o tratamento deve ser mantido por mais uma semana evitando recidivas. Se a área atingida não for as mãos, lave-as cuidadosamente após a aplicação. Agite o frasco antes de utilizar, proteja os olhos e evite inalar o produto.
警告	Não usar em caso de sensibilidade (alergia) ao nitrato de miconazol ou demais componentes da fórmula. Usar com cuidado nas regiões próximas aos olhos, evitando contato direto. 孕妇未经医疗或牙科建议不得使用该药物。 建议经常更换与患病部位接触的衣物，以避免再次感染。 如果你正在使用口服抗凝药物（如华法林），请在使用前咨询医生。如果你正在服用其他药物，使用米康唑前请咨询医生。 不良反应：轻微局部刺激（发红）、前几次使用后瘙痒和灼烧感，但通常随着治疗过程逐渐消失。但如果这些症状非常困扰、持续存在，或者出现皮疹（皮肤上出现红色溃疡），请停止治疗并告知医生。
生产线	液体

58.

产品	米康唑硝酸盐
活性成分的浓度	20毫克/克
药品形式	火药
适应症	适用于治疗由*蓟*、*表皮癣*和*小孢子*引起的足*癣*（脚气勃起）、*腹*股沟癣（腹股沟癣）、体*癣*（体内癣）和甲菌病（指甲癣）等;皮肤念珠菌病（皮肤真菌病）、*花斑癣*和染色体病。
如何使用	外部使用。 成人和儿童使用。 涂抹产品应在清洗和干燥区域后进行。每天两次涂抹足够覆盖受影响区域的量。将它涂抹在比受影响区域稍大的区域。治疗应不间断，持续直到病变完全消失。 但如果4周后仍无改善，应寻求医疗专业人员的帮助。症状消失后，应继续治疗一周，避免复发。 如果受影响的部位不是手，涂抹后请彻底清洗。
警告	如果对硝酸米康唑或其他成分过敏，请勿使用。请小心使用眼部附近区域，避免直接接触。 孕妇未经医疗或牙科建议不得使用该药物。 建议经常更换与患病部位接触的衣物，以避免再次感染。 如果你正在使用口服抗凝药物（如华法林），请在使用前咨询医生。如果你正在服用其他药物，使用米康唑前请咨询医生。 不良反应：轻微局部刺激（发红）、前几次使用后瘙痒和灼烧感，但通常随着治疗过程逐渐消失。但如果这些症状非常困扰、持续存在，或者出现皮疹（皮肤上出现红色溃疡），请停止治疗并告知医生。
生产线	实心

59.

产品	硝酸银
活性成分的浓度	最低硝酸银含量为89.5%
同义词	硝酸银铅笔
药品形式	工作人员
适应症	用于去除疣或其他小皮肤肿块。
如何使用	外部使用。 每天在患病部位涂抹一次。
警告	不要用在眼睛上。避免涂抹在健康皮肤上。 不建议用于糖尿病患者或有循环系统问题的人。
生产线	实心

60.

产品	蓖麻油
活性成分的浓度	100%蓖麻油
同义词	蓖麻油
药品形式	石油
适应症	泻药
剂量	15毫升（1汤匙）剂量促进1至3小时的水性排泄，作用迅速。
警告	注意事项与警告：大剂量服用可能引起恶心、呕吐、痉挛和严重的泻药效果。 禁忌症：慢性肠梗阻、克罗恩病、溃疡性结肠炎及肠道炎症发作时禁用。
生产线	液体

61.

产品	矿物油
活性成分的浓度	100%矿物油
同义词	液态凡士林
药品形式	石油
适应症	泻药
剂量	成人及儿童使用（6岁及以上） 治疗便秘时，晚上服用15毫升（1汤匙），醒来后第二天再加一剂。如果无效，晚上增加剂量至30毫升（2汤匙），早晨增加至15毫升。 6岁以上儿童：每公斤体重1-2毫升，晚上或早晨服用）。
警告	禁忌症：在出现恶心、呕吐、腹痛、怀孕、吞咽困难、胃食管反流及卧床患者时应避免使用。 注意事项与警告：除非医生指示，否则不得使用超过一周。食物时或有直肠出血时勿使用。如果你发现排便习惯在两周内突然发生变化，使用泻药前应咨询医生。 肛门直肠手术后不建议，因为可能会引起肛门瘙痒。 孕期及哺乳期使用：孕期长期使用可能导致新生儿出血性疾病。除非医生建议，否则不应在孕期和哺乳期间使用。 Interações medicamentosas: o uso prolongado pode reduzir a absorção das vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K), cálcio, fosfatos e alguns medicamentos administrador por via oral, como anticoagulantes, cumarínicos ou indandiônicos, anticoncepcionais e glicosídeos cardíacos. Reações adversas: efeitos metabólicos, redução do nível sérico de beta-caroteno, efeito gastrintestinais. Dosagem oral excessiva pode resultar em incontinência e prurido anal. "Atenção: O uso oral de óleo mineral aumenta o risco de desenvolvimento de pneumonia lipoídica. Pacientes com disfagia, desordens neuromusculares que afetam a deglutição e o reflexo do vômito, além de alterações estruturais da faringe e esôfago apresentam risco aumentado de desenvolvimento de pneumonia lipoídica. Esta predisposição é potencializada em neonatos e idosos."
生产线	液体

62.

产品	**Pomada de óxido de zinco 10%**
活性成分的浓度	100毫克/克
药品形式	软膏
适应症	Secativo. Para tratamento dos sintomas do eczema (pele vermelha, pequenas bolhas, coceira).
如何使用	外部使用。 Aplicar no local afetado duas ou mais vezes ao dia.
警告	O produto não deve ser usado em casos de alergia a algum dos componentes da fórmula.
生产线	半固态

63.

产品	**Emulsão de óxido de zinco 10%**
活性成分的浓度	100 mg/mL
药品形式	Emulsão
适应症	Secativo. Para tratamento dos sintomas do eczema (pele vermelha, pequenas bolhas, coceira).
如何使用	外部使用。 Aplicar no local afetado duas ou mais vezes ao dia.
警告	O produto não deve ser usado em casos de alergia a algum dos componentes da fórmula.
生产线	液体

64.

产品	**Pasta de óxido de zinco 25%**
活性成分的浓度	250 mg/g
同义词	Pasta d'água
药品形式	Pasta
适应症	Antisséptico, secativo e cicatrizante.
如何使用	外部使用。 Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto nas áreas com pelos.
警告	O produto não deve ser usado em caso de alergia a algum dos componentes da fórmula.
生产线	半固态

65.

PRODUTO	**Pasta de óxido de zinco 25% e calamina 10%**
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	Óxido de zinco 250 mg/g + calamina 100 mg/g
SINÔNIMOS	Pasta d'água com calamina
FORMA FARMACÊUTICA	Pasta
INDICAÇÃO	Antisséptico e secativo. Para alívio de coceiras leves.
MODO DE USAR	Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto nas áreas com pelos.
ADVERTÊNCIA	O produto não deve ser usado em caso de alergia a algum dos componentes da fórmula.
LINHA DE PRODUÇÃO	Semissólido

66.

PRODUTO	**Pasta de óxido de zinco 25% e enxofre 10%**
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	Óxido de zinco 250 mg/g + enxofre 100 mg/g
SINÔNIMOS	Pasta d'água com enxofre
FORMA FARMACÊUTICA	Pasta
INDICAÇÃO	Escabiose (sarna), principalmente, quando houver infecção secundária.
MODO DE USAR	Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto nas áreas com pelos.
ADVERTÊNCIA	O produto não deve ser usado em caso de alergia a algum dos componentes da fórmula.
LINHA DE PRODUÇÃO	Semissólido

67.

PRODUTO	**Pasta de óxido de zinco 25% e mentol 0,5%**
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	Óxido de zinco 250 mg/g + mentol 5 mg/g
SINÔNIMOS	Pasta d'água mentolada
FORMA FARMACÊUTICA	Pasta
INDICAÇÃO	Antisséptico, secativo e cicatrizante.
MODO DE USAR	Uso externo. Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto nas áreas com pelos.
ADVERTÊNCIA	O produto não deve ser usado em caso de alergia a algum dos componentes da fórmula.
LINHA DE PRODUÇÃO	Semissólido

68. *(Redação dada pela Instrução Normativa 265/2023)*

Redações Anteriores

PRODUTO	**Paracetamol**
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	500 mg 750 mg
FORMA FARMACÊUTICA	Comprimido Comprimido revestido
INDICAÇÃO	Indicado para redução da febre e o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites, dor de garganta e cólica menstrual
POSOLOGIA	Os comprimidos devem ser administrados por via oral, com líquido. Uso adulto (acima de 12 anos). ATENÇÃO: A dose diária total recomendada de paracetamol é de 4000 mg administrados em doses racionadas, não excedendo 1000 mg/dose em intervalos de 4 a 6 horas, em um período de 24horas. A duração do tratamento depende da remissão dos sintomas.
ADVERTÊNCIA	A dose recomendada de paracetamol não deve ser ultrapassada. Não use com outro produto que contenha paracetamol. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Este medicamento contém paracetamol. Pacientes adultos podem desenvolver insuficiência hepática aguda no caso de ingestão de mais de 4g de paracetamol em 24 horas, uso concomitante de outros medicamentos contendo paracetamol ou ingestão de 3 ou mais doses de bebida alcoólica por dia durante o tratamento. Consulte seu médico antes de usar o medicamento se você já possui problemas no fígado. Consulte seu médico antes de utilizar este medicamento se você está tomando varfarina ou outros derivados cumarínicos.
LINHA DE PRODUÇÃO	Sólido

69. *(Redação dada pela Instrução Normativa 265/2023)*

Redações Anteriores

PRODUTO	Paracetamol
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	200 mg/mL
FORMA FARMACÊUTICA	Solução
INDICAÇÃO	Uso adulto e pediátrico. Indicado para redução da febre e o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor no corpo, dor de dente, dor nas costas, dores musculares, dores leves associadas a artrites, dor de garganta e cólica menstrual.
POSOLOGIA	Uso pediátrico. Para crianças abaixo de 11 kg ou 2 anos: consultar o médico antes de usar. A dose recomendada de paracetamol varia de 10 a 15 mg/kg/dose, com intervalos de 4 a 6 horas entre cada administração. Não exceda 5 administrações (aproximadamente 50 - 75 mg/kg), em um período de 24 horas. Uso adulto (acima de 12 anos). A dose diária máxima de paracetamol é de 4000 mg administrados em doses fracionadas, não excedendo a dose de 1000 mg/dose no intervalo de 4 a 6 horas, no período de 24 horas. Duração do tratamento: depende da remissão dos sintomas. Obs.: Quando aplicável, informar a equivalência da dose em gotas considerando as características do produto.
ADVERTÊNCIA	A dose recomendada de paracetamol não deve ser ultrapassada. NÃO administrar este medicamento diretamente na boca do paciente. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Não use com outro produto que contenha paracetamol. 这种药含有对乙酰氨基酚。成人患者如果在24小时内摄入超过4克对乙酰氨基酚、使用其他含扑热息痛的药物或在治疗期间每天饮用3杯或以上饮品，可能会发展为急性肝衰竭。 如果你已经有肝脏问题，使用前请咨询医生。 如果您正在服用华法林或其他衍生物，使用该药物前请咨询医生 库马里尼科斯。
生产线	液体

70. *（文本来源于规范性指令265/2023）*

以往草稿

产品	扑热息痛
活性成分的浓度	32 mg/mL 100 mg/mL 140 mg/mL
药品形式	悬挂 解决方案
适应症	成人和儿童使用。 用于退烧和暂时缓解轻度至中度疼痛，如流感和普通感冒相关的疼痛、头痛、身体疼痛、牙痛、背痛、肌肉酸痛、与关节炎相关的轻度疼痛、喉咙痛和经痛。
剂量	成人使用。 扑热息痛可以不考虑饮食情况。对乙酰氨基酚的总日剂量不应超过75毫克/公斤或4000毫克的剂量。 儿童使用（12岁以下）。 对乙酰氨基酚的推荐剂量范围为10至15毫克/公斤/剂量，每次给药间隔4至6小时。每次服用时间不超过5次（约50 - 75毫克/公斤），每次24次 几个小时。体重11公斤以下或2岁以下的儿童，使用前请咨询医生。 注意：如适用，请根据产品特性告知剂量的滴剂等效性。
警告	对乙酰氨基酚的推荐剂量不应超过。 切勿直接将此药物送入患者口腔。 孕妇在未获得医疗或牙科建议的情况下不得使用该药物。 不要与其他含对乙酰氨基苯的产品一起使用。 这种药含有对乙酰氨基酚。成人患者若24小时内服用超过4克扑热息痛，且同时使用其他药物，可能出现急性肝衰竭 治疗期间服用对乙酰氨基酚或每天饮用3杯或以上饮品。如果你已经有肝脏问题，使用前请咨询医生。 如果您正在服用华法林或其他衍生物，使用该药物前请咨询医生 库马里尼科斯。
生产线	液体

71. *（文本来源于规范性指令265/2023）*

以往草稿

产品	对乙酰氨基酚+咖啡因
活性成分的浓度	扑热息痛 500毫克 + 咖啡因 65毫克
药品形式	压缩 涂层平板
适应症	它用于缓解头痛的症状，同时也有助于退烧和暂时缓解轻度至中度疼痛，如流感和普通感冒相关的疼痛、牙痛、背痛、肌肉痛、关节炎和经痛相关的疼痛。
剂量	12岁以上成人和儿童均可参加。 每4到6小时服用1到2片。在24小时内，分组服用的总量不得超过8片。 治疗持续时间：取决于症状的消失程度。 注意：对乙酰氨基酚推荐每日总剂量为4000毫克，分段服用，且每24小时内每4至6小时服用剂量不得超过1000毫克
警告	对乙酰氨基酚的推荐剂量不应超过。 孕妇在未获得医疗或牙科建议的情况下不得使用该药物。 不要与其他含对乙酰氨基苯的产品一起使用。 这种药含有对乙酰氨基酚。成人患者如果在24小时内摄入超过4克对乙酰氨基酚、使用其他含扑热息痛的药物或在治疗期间每天饮用3杯或以上饮品，可能会发展为急性肝衰竭。如果你已经有肝脏问题，使用前请咨询医生。 Consulte seu médico antes de utilizar este medicamento se você está tomando varfarina ou outros derivados cumarínicos.
LINHA DE PRODUÇÃO	Sólido

72.

PRODUTO	Pó de alúmen de potássio
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	Mínimo 99,5% de sulfato de alumínio e potássio
SINÔNIMOS	Pedra hume, sulfato de alumínio e potássio
FORMA FARMACÊUTICA	Pó
INDICAÇÃO	Adstringente, para conter pequenos sangramentos.
MODO DE USAR	Aplicar sobre os ferimentos. Uso limitado a pequenos cortes na pele. Utilizar na forma sólida ou em solução a 1% de pedra hume em 100 mL de água filtrada ou fervida.
ADVERTÊNCIA	Soluções acima da concentração indicada podem causar efeito irritante ou corrosivo. A ingestão acidental pode causar hemorragia gastrintestinal. Neste caso, procurar imediatamente auxílio médico.
LINHA DE PRODUÇÃO	Sólido

73.

PRODUTO	Permanganato de potássio
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	100 mg de permanganato de potássio
FORMA FARMACÊUTICA	Comprimido Pó
INDICAÇÃO	Dermatites exsudativas, como adstringente e antisséptico.
MODO DE USAR	Uso externo. Diluir o comprimido no momento do uso, em um a quatro litros de água e usar na forma de compressas ou no banho, ou a critério médico.
ADVERTÊNCIA	Não ingerir. O uso de soluções concentradas pode ser cáustico e o uso frequente pode ser irritante para a pele, além de tingi-la de marrom. No caso de ingestão acidental, procurar auxílio médico. O uso excessivo na mucosa vaginal pode alterar o pH local, acelerando a descamação do epitélio e eliminando os bacilos de Döederlein (flora vaginal normal). As duchas vaginais devem ser usadas, exclusivamente, em casos de infecções purulentas.
LINHA DE PRODUÇÃO	Sólido

74.

PRODUTO	Gel de peróxido de benzoíla
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	25 mg/g de peróxido de benzoíla (2,5%) 30 mg/g de peróxido de benzoíla (3%) 40 mg/g de peróxido de benzoíla (4%) 50 mg/g de peróxido de benzoíla (5%) 80 mg/g de peróxido de benzoíla (8%)
FORMA FARMACÊUTICA	Gel
INDICAÇÃO	Tratamento da acne.
MODO DE USAR	Uso externo. Aplicar fina camada de gel nas áreas afetadas, uma a duas vezes ao dia. Recomendável uso de bloqueador solar não alcoólico durante o dia.
ADVERTÊNCIA	Uso adulto e pediátrico (acima de 12 anos). Evitar exposição ao sol durante o tratamento devido a possibilidade de manchas na pele. O peróxido de benzoíla pode descolorir os cabelos e manchar roupas. Pode ocorrer sensibilização de contato em alguns pacientes, além de vermelhidão e descamação. Em uso prolongado ocasiona dermatite. Medicamento contraindicado a indivíduos com hipersensibilidade ao peróxido de benzoíla. Reações Adversas: dermatite de contato, eritema, ardor, vermelhidão, descamação e hipersensibilidade.
LINHA DE PRODUÇÃO	Semissólido

75.

PRODUTO	Sabonete líquido de peróxido de benzoíla 2,5%
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	25 mg/g
FORMA FARMACÊUTICA	Sabonete líquido
INDICAÇÃO	Tratamento da acne.
MODO DE USAR	Uso externo. Umedeça a pele, passe o sabonete cobrindo com espuma toda a área afetada. Deixe alguns minutos e enxágue com água. Use 2 a 3 vezes ao dia, ou conforme orientação médica.
ADVERTÊNCIA	Uso adulto e pediátrico (acima de 12 anos) No caso de desenvolvimento de irritações, suspender o uso e procurar um médico. Cuidado ao aplicar o produto próximo aos olhos, à boca e às mucosas. Caso entre em contato com os olhos ou mucosas, lavar abundantemente com água. Evitar exposição desnecessária da área tratada ao sol.
LINHA DE PRODUÇÃO	Líquido

76.

PRODUTO	Loção de peróxido de benzoíla 5%
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	5 g/100 mL
SINÔNIMOS	Emulsão de peróxido de benzoíla
FORMA FARMACÊUTICA	Emulsão
INDICAÇÃO	Tratamento da acne.
MODO DE USAR	Uso externo. Aplicar fina camada da loção nas áreas afetadas, uma a duas vezes ao dia. Recomendável uso de bloqueador solar não alcoólico durante o dia.
警告	Uso adulto e pediátrico (acima de 12 anos). 治疗期间避免阳光照射，以免出现皮肤瑕疵。过氧化苯甲酰可能会染发并染色衣物。部分患者可能出现接触性敏感，同时出现发红和鳞屑。 长期使用会导致皮炎。对过氧化苯甲酰过敏的人群禁用药物。 不良反应：接触性皮炎、红斑、灼烧感、发红、鳞屑和过敏。
生产线	液体

77.

产品	5%过氧化苯甲酰肥皂
活性成分的浓度	50毫克/克
药品形式	肥皂
适应症	痤疮治疗。
如何使用	外部使用。 润湿皮肤，用泡沫覆盖整个受影响区域。让它保持几分钟，然后用水冲洗。每天使用2到3次，或按照指示使用。
警告	成人及儿童使用（12岁以上）。 若出现刺激，应停止使用并寻求医疗帮助。在眼睛、口腔和黏膜附近涂抹时要小心。如果接触到眼睛或黏膜，请用水彻底冲洗。避免治疗区域不必要的阳光照射。
生产线	实心

78.

产品	过氧化苯甲酰凝胶 10%
活性成分的浓度	100毫克/克
药品形式	过来这里
适应症	痤疮治疗。
如何使用	外部使用。 晚上睡前，将凝胶涂抹在受影响部位。一周内，只需将产品放在受影响表面1小时后冲洗即可。使用后如果没有刺激，涂抹在受影响的表面并整晚保持，第二天早上清洗。建议白天使用无酒精防晒霜。
警告	成人及儿童使用（12岁以上）。 治疗期间避免阳光照射，以免出现皮肤瑕疵。过氧化苯甲酰可能会染发并染色衣物。部分患者可能出现接触性敏感，同时出现发红和鳞屑。长期使用会导致皮炎。 对过氧化苯甲酰过敏的人群禁用药物。 不良反应：接触性皮炎、红斑、灼烧感、发红。脱排和过敏反应。
生产线	半固态

79.

产品	过氧化苯甲酰+硫
活性成分的浓度	过氧化苯甲酰 50 mg/g + 硫 20 mg/g
药品形式	奶油
适应症	局部痤疮治疗
如何使用	外部使用。 每天两次涂抹，早晚各一次，只要治疗部位不暴露在阳光下即可。每次涂抹前，用水和中性肥皂清洗该区域。涂抹时应用指尖小心地分开，不要揉搓。避免使用夸张的数量。必须完成适应测试，并在此期间后遵循指示的使用方式。 适配测试： 第一步：连续4天，将乳膏涂抹在患处，每天仅让产品与皮肤接触两小时。然后用水和中性肥皂去除。如果耐受性良好，就采取第二步。 第二步：连续4天，将乳霜涂抹在患病部位，每天只让产品接触皮肤4小时。然后用水和中性肥皂去除。如果这四天内没有不适或不耐受，就遵循第三步。 第三步：将乳霜涂抹在受影响部位4天，并让产品与皮肤接触过夜。早上用水和温和的肥皂去除。适应阶段结束后，根据使用方式正常使用产品。
警告	治疗期间避免强烈阳光，但如果需要暴露，白天不应使用该乳膏。在这种情况下，应涂抹保护系数至少为SPF 30的防晒霜。 涂抹后几天，皮肤会开始脱落，仿佛被晒伤，可能会出现灼烧、干燥和发红，这些症状如果适度，是正常且可取的。 O uso pediátrico e por gestantes deve ser feito conforme orientação médica.
LINHA DE PRODUÇÃO	Semissólido

80.

PRODUTO	Solução de peróxido de hidrogênio 3%
CONCENTRAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO	3 g de peróxido de hidrogênio em água purificada qsp 100 mL
SINÔNIMOS	Água oxigenada 10 volumes
FORMA FARMACÊUTICA	Solução
INDICAÇÃO	Antisséptico
MODO DE USAR	Uso externo. Aplicar sobre o local, previamente limpo para a assepsia de ferimentos. Gargarejos ou bochechos: diluir 1 colher de sopa do produto em 1/2 copo de água filtrada ou fervida.
ADVERTÊNCIA	Cuidado com os olhos e mucosas. Pode clarear os pelos ou cabelos. O uso prolongado deve ser evitado. O uso desta solução como enxaguante bucal pode causar ulcerações ou inchaço na boca.
LINHA DE PRODUÇÃO	Líquido

81.

PRODUTO	Polietilenoglicol 3350
FORMA FARMACÊUTICA	Pó para solução
INDICAÇÃO	Desimpactação e manutenção no quadro de constipação persistente e ocasional. Preparação de pacientes para realização do exame de colonoscopia.
POSOLOGIA	Uso adulto. Desimpactação/Desobstrução Intestinal: iniciar a administração com 1 g/kg/dia e, caso necessário, corrigir a dose até 1,5 g/kg/dia pelo período de 6 dias. Não exceder a dose de 100 g por dia. Manutenção: Iniciar a administração com 0,4 g/kg/dia e, caso necessário, corrigir a dose até 1,5 g/kg/dia pelo período de até 6 meses. Não exceder a dose de 100 g por dia. Preparação Para Colonoscopia: Administrar 4,5 g/kg/dia um dia antes do exame. Recomenda-se dissolver 17 gramas em 250 mL de líquido e ingerir a solução a cada 30 minutos até o limite de 255 gramas por dia. A administração do medicamento deve ser finalizada até 8 horas antes do procedimento. Uso pediátrico. Desimpactação/Desobstrução Intestinal: Iniciar a administração com 1 g/kg/dia e, caso necessário, corrigir a dose até 1,5 g/kg/dia pelo período de 6 dias. Não exceder a dose de 100 g por dia. Manutenção: Iniciar a administração com 0,4 g/kg/dia e, caso necessário, corrigir a dose até 1,5 g/kg/dia pelo período de até 6 meses. Não exceder a dose de 100 g por dia. Preparação Para Colonoscopia: Entre 2 e 6 anos: Administrar 4,5 g/kg/dia um dia antes do exame. Recomenda-se dissolver 8,5 gramas em 150 mL de líquido e ingerir a solução a cada 30 minutos até o limite de 255 gramas por dia. A administração do medicamento deve ser finalizada até 8 horas antes do procedimento. Acima de 7 anos: Administrar 4,5 g/kg/dia um dia antes do exame. Recomenda-se dissolver 17 gramas em 250 mL de líquido e ingerir a solução a cada 30 minutos até o limite de 255 gramas por dia. A administração do medicamento deve ser finalizada até 8 horas antes do procedimento. Obs: É responsabilidade da empresa incluir no material de rotulagem do produto informação sobre o modo de uso que atenda à posologia estabelecida. Se o medicamento for comercializado em dose múltipla deverá vir acompanhado de acessório dosador.
ADVERTÊNCIA	Esse medicamento pode causar diarreias, flatulências, náuseas, cólicas abdominais ou inchaços. No caso de dúvidas, consultar um profissional de saúde. Não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Esse medicamento é contraindicado para paciente com quadro conhecido ou suspeito de obstrução (náusea, vômito e dor abdominal), perfuração intestinal, apendicite e sangramento retal. O medicamento deve ser administrado conforme orientação presente na rotulagem e bula ou conforme orientação médica. A solução não deve ser armazenada para uso posterior.
生产线	实心

82.

产品	聚乙二醇4000
药品形式	溶液粉末
适应症	便秘。
剂量	成人和儿童使用（超过2年）。 建议每天使用0.7克/公斤。每天不要超过20克的限制。 注意：公司有责任在产品标签材料中包含符合既定剂量的使用方式信息。如果药物以多次剂量销售，必须配合服用辅助药。
警告	该药物可能引起腹痛、腹胀、腹泻、恶心和呕吐。 使用超过2周应由专业人员陪同。 孕妇或哺乳期妇女未经医学或牙科外科医生指导不得使用。 该药物禁忌适用于已知或疑似对聚乙二醇过敏、炎症性肠病（如溃疡性结肠炎、克罗恩病）、肠道异常扩张、肠穿孔风险、疑似肠梗阻或肠道症状性狭窄、不明原因腹部疼痛的患者。 如果你有肝脏或肾功能衰竭、正在服用利尿剂或血钾偏低，服用此药前请咨询医生或药剂师。
生产线	固体

83.

产品	聚乙二醇4000
药品形式	解决方案
适应症	便秘。
剂量	成人和儿童使用（超过2年）。 建议每天使用0.7克/公斤。每天不要超过20克的限制。 注意：公司有责任在产品标签材料中包含符合既定规范的使用方式。如果药物以多次剂量销售，必须配合服用辅助药。
警告	该药物可能引起腹痛、腹胀、腹泻、恶心和呕吐。 使用超过2周应由专业人员陪同。 孕妇或哺乳期妇女未经医学或牙科外科医生指导不得使用。 该药物禁忌适用于已知或疑似对聚乙二醇过敏、炎症性肠病（如溃疡性结肠炎、克罗恩病）、肠道异常扩张、肠穿孔风险、疑似肠梗阻或肠道症状性狭窄、不明原因腹部疼痛的患者。 如果你有肝脏或肾衰竭、正在服用利尿剂或血钾偏低，服用此药前请咨询医生或药剂师。
生产线	液体

84.

产品	尿布疹软膏
活性成分的浓度	维生素A：1000至5000 IU/g;维生素D为400至900 IU/g;氧化锌 10%到15%（含水/水）
药品形式	软膏
适应症	干燥、愈合软膏，用于预防和治疗尿布疹和皮疹。
如何使用	外部使用。 清洁后必要时涂抹于患处。
警告	如果对配方成分过敏，请勿使用。
生产线	半固态

85.

产品	会阴裂软膏
活性成分的浓度	乙酸氢化可的松5毫克/克（0.5%）;利多卡因碱20毫克/克（2.0%）;亚胞亚没食酸酯20毫克/克（2.0%）;氧化锌 100 mg/g（10%）
药品形式	软膏
适应症	内痔或外痔引起的疼痛和出血、肛门瘙痒、肛周湿疹、轻度直肠炎（肛门和直肠炎症）以及肛裂。
如何使用	成人使用。 外部使用。 每天涂抹两到三次，涂抹在受影响部位。症状减轻后，每天施用一次，连续两到三天，或由医生自行决定。
警告	如果对配方成分过敏，请勿使用。该产品在儿童、孕妇和哺乳期妇女中的安全性和有效性尚未被确定。
生产线	半固态

86.

产品	口服补液盐
活性成分的浓度	氯化钠3.5克+氯化钾1.5克+柠檬酸钠二水合物2.9克+葡萄糖20克。 注意：根据第108/91号条例，稀释后：钠90 mEq/L + 钾20至25 mEq/L + 氯离子 80 mEq/L + 柠檬酸盐 30至35 mEq/L + 葡萄糖 111 mmol/L
药品形式	火药
适应症	用于补充积累的水分和电解质流失（补液），或在急性腹泻时维持水分（补液阶段后）。
剂量	成人及儿童用途 将信封溶解在一升过滤或沸水中。在4到6小时内，给药75毫升/公斤体重，最多4升。给体重小于2.6公斤的患者注射200毫升。 如果在治疗的前两小时内呕吐导致患者无法摄入溶液，应立即就医。
警告	肠梗阻、瘫痪或穿孔患者及持续性呕吐患者禁用。 注意事项：肾功能受损患者应谨慎使用。 警告：准备时请注意，使用推荐的煮沸水量。准备溶液后，24小时内未食用的应丢弃。 儿童应继续母乳喂养。 6个月以下且未哺乳的儿童在此期间应给予100至200毫升饮用水。 在治疗的早期阶段，成人在仍处于脱水状态时，如果需要，每小时可饮用最多750毫升饮用水，儿童则可达到每公斤/小时20毫升。
生产线	实心

87.

产品	口服补液盐
活性成分的浓度	氯化钠2.6克+氯化钾1.5克+柠檬酸钠二水合物2.9克+葡萄糖13.5克。 注意：稀释后的mmol/L浓度： 葡萄糖：75 + 钠：75 + 钾：20 + 氯：65 + 柠檬酸：10。渗透压：245
药品形式	火药
适应症	用于补充积累的水分流失和（补水）或在急性腹泻时维持水分（补水阶段后）。
剂量	成人及儿童用途 将信封溶解在一升过滤或沸水中。在4到6小时内，给药75毫升/公斤体重，最多4升。给体重小于2.6公斤的患者注射200毫升。如果在治疗的前两小时内呕吐导致患者无法摄入溶液，应立即就医。
警告	肠梗阻、瘫痪或穿孔患者及持续性呕吐患者禁用。 注意事项：肾功能受损患者应谨慎使用。 警告：准备时请注意，使用推荐的煮沸水量。准备溶液后，24小时内未食用的应丢弃。 儿童应继续母乳喂养。在治疗的早期阶段，成人在仍处于脱水状态时，如果需要，每小时可饮用最多750毫升饮用水，儿童则可达到每公斤/小时20毫升。
生产线	实心

88. *（文本来源于规范性指令265/2023）*

以往草稿

产品	西梅蒂科纳
活性成分的浓度	75 mg/mL
药品形式	口腔乳剂 悬挂
适应症	缓解消化系统中过多气体引起的症状，这些气体会引起、腹部不适、腹腔增大、腹部疼痛或痉挛。 为患者准备接受消化内镜和/或结肠镜检查。
剂量	儿童用法。 2岁以下儿童：每次剂量最多15毫克。如有需要，重复此剂量，间隔6小时。剂量不要超过每天180毫克。 2至12岁儿童：最低服用15毫克，最高30毫克。如有必要，重复此剂量，并配合 6小时间隔。剂量不要超过每天180毫克。 成人使用。 成人：每份最低40毫克，最高125毫克。（注：最大剂量可由公司酌情降低。）如有需要，重复此剂量，间隔6小时。每日剂量不得超过500毫克。 用于为患者准备消化内镜和/或结肠镜检查：按医生指示的使用方式。 注意：对于以滴剂为单位的产品，必须告知与剂量相等的滴剂数量， 考虑产品的特性。
警告	除非有医疗指导，否则不要超过标示的最大剂量。 禁忌症：严重腹胀;严重肠绞痛;持续疼痛（超过36小时）;腹部区域有可触及肿块;对西甲硅油及其衍生物过敏;疑似或已知肠道穿孔或阻塞。 不良反应：腹泻、恶心、反流和呕吐。
生产线	液体

89.

产品	西梅蒂科纳
活性成分的浓度	150 mg/mL
药品形式	口腔乳剂
适应症	缓解消化系统中过多气体引起的症状，这些气体会引起、腹部不适、腹腔增大、腹部疼痛或痉挛。 为患者准备接受消化内镜和/或结肠镜检查。
剂量	儿童用法。 2岁以下儿童：每次剂量最多15毫克。如有需要，重复此剂量，间隔6小时。剂量不要超过每天180毫克。 2至12岁儿童：最低服用15毫克，最高30毫克。如有需要，重复此剂量，间隔6小时。剂量不要超过每天180毫克。 成人使用。 成人：每份最低40毫克，最高125毫克。（注：最大剂量可由公司酌情降低。）如有需要，重复此剂量，间隔6小时。每日剂量不得超过500毫克。 用于为患者准备消化内镜和/或结肠镜检查：按医生指示的使用方式。 注意：对于滴剂产品，必须根据产品特性告知相当剂量的滴剂数量。
警告	除非有医疗指导，否则不要超过标示的最大剂量。 禁忌症：严重腹胀;严重的肠绞痛;持续疼痛（超过36小时）;腹部区域有可触摸肿块;对西甲硅油及其衍生物过敏;疑似或已知肠道穿孔或阻塞。 不良反应：腹泻、恶心、反流和呕吐。
生产线	液体

90.

产品	西梅蒂科纳
活性成分的浓度	40毫克
药品形式	压缩
适应症	缓解消化系统中过多气体引起的症状，这些气体会引起、腹部不适、腹腔增大、腹部疼痛或痉挛。 为患者准备接受消化内镜和/或结肠镜检查。
剂量	儿童用法。 2至12岁儿童：服用1片。如有需要，重复此剂量，间隔6小时。不要超过每天6片的剂量。 成人使用。 成人：服用1-3片。如有需要，重复此剂量，间隔6小时。剂量不要超过每天12片。 用于为患者准备消化内镜和/或结肠镜检查：按医生指示的使用方式。
警告	除非有医疗指导，否则不要超过标示的最大剂量。 禁忌症：严重腹胀;严重的肠绞痛;持续疼痛（超过36小时）;腹部区域有可触摸肿块;对西甲硅油及其衍生物过敏;疑似或已知肠道穿孔或阻塞。 不良反应：腹泻、恶心、反流和呕吐。
生产线	实心

91.

产品	西梅蒂科纳
活性成分的浓度	80毫克
药品形式	压缩
适应症	缓解消化系统中过多气体引起的症状，这些气体会引起、腹部不适、腹腔增大、腹部疼痛或痉挛。 为患者准备接受消化内镜和/或结肠镜检查
剂量	成人使用。 服用1-2片。如有需要，重复此剂量，间隔6小时。不要超过每天6片的剂量。 用于为患者准备消化内镜和/或结肠镜检查：按医生指示的使用方式。
警告	除非有医疗指导，否则不要超过标示的最大剂量。 禁忌症：严重腹胀;严重的肠绞痛;持续疼痛（超过36小时）;腹部区域有可触摸肿块;对西甲硅油及其衍生物过敏;疑似或已知肠道穿孔或阻塞。 不良反应：腹泻、恶心、反流和呕吐。
生产线	实心

92. *（文本来源于规范性指令265/2023）*

以往草稿

产品	西梅蒂科纳
活性成分的浓度	125毫克
药品形式	咀嚼片 摩尔胶囊 硬质胶囊 可分散颗粒
适应症	缓解消化系统中过多气体引起的症状，这些气体会引起、腹部不适、腹腔增大、腹部疼痛或痉挛。 为患者准备接受消化内镜和/或结肠镜检查。
剂量	成人使用。 服用一单位的药物。如有需要，重复此剂量，间隔6小时。剂量不要超过每天4单位。 用于为患者准备消化内镜和/或结肠镜检查：按医生指示的使用方式。
警告	不要整颗吞下药片。吞下前要仔细咀嚼药片。（针对咀嚼片）。 除非有医疗指导，否则不要超过标示的最大剂量。 禁忌症：严重腹胀;严重的肠绞痛;持续疼痛（超过36小时）;腹部区域有可触摸肿块;对西甲硅油及其衍生物过敏;疑似或已知肠道穿孔或阻塞。不良反应：腹泻、恶心、反流和呕吐。
生产线	实心

93.

产品	西梅蒂科纳
活性成分的浓度	150毫克
药品形式	压缩 摩尔胶囊
适应症	缓解消化系统中过多气体引起的症状，这些气体会引起、腹部不适、腹腔增大、腹部疼痛或痉挛。 为患者准备接受消化内镜和/或结肠镜检查。
剂量	成人使用。 服用一单位的药物。如有需要，重复此剂量，间隔8小时。剂量不要超过每天3单位。 用于为患者准备消化内镜和/或结肠镜检查：按医生指示的使用方式。
警告	除非有医疗指导，否则不要超过标示的最大剂量。 禁忌症：严重腹胀;严重的肠绞痛;持续疼痛（超过36小时）;腹部区域有可触摸肿块;对西甲硅油及其衍生物过敏;疑似或已知肠道穿孔或阻塞。 不良反应：腹泻、恶心、反流和呕吐。
生产线	实心

94.

产品	西梅蒂科纳
活性成分的浓度	180毫克
药品形式	鼹鼠胶囊
适应症	缓解消化系统中过多气体引起的症状，这些气体会引起、腹部不适、腹腔增大、腹部疼痛或痉挛。 为患者准备接受消化内镜和/或结肠镜检查。
剂量	成人使用。 服用一颗胶囊。如有需要，重复此剂量，间隔12小时。每天不要超过2粒胶囊的剂量。 用于为患者准备消化内镜和/或结肠镜检查：按医生指示的使用方式。
警告	除非有医疗指导，否则不要超过标示的最大剂量。 禁忌症：严重腹胀;严重肠绞痛;持续疼痛（超过36小时）;腹部区域有可触及肿块;对西甲硅油及其衍生物过敏;疑似或已知肠道穿孔或阻塞。 不良反应：腹泻、恶心、反流和呕吐。
生产线	实心

95.

产品	西梅蒂科纳
活性成分的浓度	250毫克
药品形式	鼹鼠胶囊
适应症	缓解消化系统中过多气体引起的症状，这些气体会引起、腹部不适、腹腔增大、腹部疼痛或痉挛。 为患者准备接受消化内镜和/或结肠镜检查。
剂量	成人使用。 服用一颗胶囊。如有需要，重复此剂量，间隔12小时。每天不要超过2粒胶囊的剂量。 用于为患者准备消化内镜和/或结肠镜检查：按医生指示的使用方式。
警告	除非有医疗指导，否则不要超过标示的最大剂量。 禁忌症：严重腹胀;严重肠绞痛;持续疼痛（超过36小时）;腹部区域有可触及肿块;对西甲硅油及其衍生物过敏;疑似或已知肠道穿孔或阻塞。 不良反应：腹泻、恶心、反流和呕吐。
生产线	实心

96.

产品	含碘的抗真菌溶液
活性成分的浓度	碘 5 mg/mL（0.5%）;碘化钾 10 mg/mL（1%）;水杨酸 20 mg/mL（2%）;苯甲酸 20 mg/mL（2%）;苯甲酰酊剂 0.05 mL/mL（5%）
药品形式	解决方案
适应症	抗真菌
如何使用	外部使用。 每天涂抹两到三次，涂抹在受影响部位。
警告	该产品不应用于碘过敏、开放性伤口（可能导致碘吸收）和封闭敷料的情况。 使用限制：新生儿和孕妇，因为可能导致碘中毒。避免长期使用。如果溶液颜色或气味发生变化，应停止使用。
生产线	液体

97.

产品	氯化钠溶液 0.9%
活性成分的浓度	9 mg/mL
同义词	0.9%氯化钠的生理盐水溶液
药品形式	解决方案
适应症	用来雾化和清洗伤口。
如何使用	雾化：按照制造商说明书进行。 伤口清洗：涂抹在伤口上。
警告	如果液体不透明、无色、透明且无味，请勿使用。它不含防腐剂。
生产线	液体或无菌溶液

98.

产品	氯化钠鼻用溶液 0.9%
活性成分的浓度	9 mg/mL 注意：溶液必须是无菌的，装入带有喷雾瓶的喷瓶中，并配有保证产品在整个使用期间无菌的分配器。
同义词	氯化钠-无菌溶液 0.9%
药品形式	解决方案
适应症	鼻腔液体消毒剂和减充血剂。
如何使用	根据需要将溶液涂抹在鼻孔上。
警告	禁忌症：对配方成分有过敏史的患者。
生产线	无菌溶液

99.

产品	氯化钠鼻用溶液 0.9%
活性成分的浓度	9 mg/mL
同义词	无防腐剂0.9%氯化钠鼻用溶液
药品形式	解决方案
适应症	鼻腔液体消毒剂和减充血剂。
如何使用	根据需要将溶液涂抹在鼻孔上。
警告	禁忌症：对配方成分有过敏史的患者。
生产线	液体

100.

产品	0.9%氯化钠鼻用溶液含防腐剂
活性成分的浓度	9 mg/mL
同义词	氯化钠溶液 0.9%
药品形式	解决方案
适应症	鼻腔液体消毒剂和减充血剂。
如何使用	根据需要将溶液涂抹在鼻孔上。
警告	禁忌症：对配方成分有过敏史的患者。
生产线	液体

101.

产品	3%氯化钠鼻用溶液
活性成分的浓度	30 mg/mL
同义词	氯化钠溶液 3%
药品形式	解决方案
适应症	流水消毒剂、减充血剂和鼻腔加湿器。协助治疗其他呼吸系统疾病，如过敏性鼻炎、鼻窦炎、鼻窦炎、鼻后滴漏。鼻窦手术术后期。
如何使用	成年： 根据需要进行一到两次鼻雾化/点滴，尤其是在晚上、睡前或根据医学标准进行，直到症状消失。 儿科（3至12岁）： 每天两次鼻雾化/点注，或根据医学标准进行。
警告	禁忌症：对配方敏感，以及使用可能发生钠潴留的药物的患者，如利尿剂、泻药和皮质类固醇。 不良反应：鼻部刺激和灼烧感。
生产线	液体

102.

产品	预防口腔脱水的解决方案
活性成分的浓度	氯化钠 2.05 mg/mL + 柠檬酸钾一水合物 2.16 mg/mL + 柠檬酸钠二水合物 0.98 mg/mL + 葡萄糖单水合物 25.00 mg/mL（相当于22.5 mg/mL无水葡萄糖）
药品形式	口服溶液
适应症	防止脱水并在补水阶段后维持水分。
剂量	成虫用途 每小时给药750毫升溶液，最高限量为4升/天。 婴幼儿：每小时给药液20毫升/公斤，最高限量为75毫升/公斤/天。 如果治疗前两小时内呕吐导致患者无法施用溶液，应立即就医。
警告	禁忌症：肠道阻塞、穿孔或瘫痪及持续呕吐的患者。 注意事项：肾功能受损患者应谨慎使用。如果液体摄入过快，可能会出现呕吐。 儿童应继续母乳喂养。
生产线	液体

103.

产品	口服补液溶液
活性成分的浓度	氯化钠 4.68 mg/mL + 柠檬酸钾一水合物 2.16 mg/mL + 柠檬酸钠二水合物 0.98 mg/mL + 无水葡萄糖 20.00 mg/mL
药品形式	口服溶液
适应症	口服补液。
剂量	成虫用途 每小时给药750毫升溶液，最高限量为4升/天。 婴幼儿：每小时给药液20毫升/公斤，最高限量为75毫升/公斤/天。 如果在治疗的前两小时内呕吐持续导致患者无法施用溶液，应立即就医。
警告	禁忌症：肠道阻塞、穿孔或瘫痪及持续呕吐的患者。 注意事项：肾功能受损患者应谨慎使用。如果液体摄入过快，可能会出现呕吐。 儿童应继续母乳喂养。
生产线	液体

104.

产品	口服补液溶液
活性成分的浓度	氯化钠 2.6 克/升 + 氯化钾 1.5 克 /升 + 柠檬酸钠二水合物 2.9 克/升 + 葡萄糖 13.5 克/升。 注意：浓度以mmol/L或mEq/L计： 葡萄糖：75 + 钠：75 + 钾：20 + 氯：65 + 柠檬酸：10。渗透压：245。
药品形式	解决方案
适应症	用于补充积累的水分流失和（补水）或在急性腹泻时维持水分（补水阶段后）。
剂量	成人及儿童用途 在4到6小时内，给药75毫升/公斤体重，最多4升。给体重小于2.6公斤的患者注射200毫升。 如果在治疗的前两小时内呕吐持续导致患者无法施用溶液，应立即就医。
警告	便秘、肠梗阻或穿孔患者及无法控制性呕吐患者禁用。 它不会与食物或其他药物相互作用。 在推荐剂量下未观察到不良反应。 注意事项：肾功能受损患者应谨慎使用。 警告：打开溶液后，24小时内未食用的物品应丢弃。 儿童应继续母乳喂养。在治疗的早期阶段，成人在仍处于脱水状态时，如果需要，每小时可饮用最多750毫升饮用水，儿童则可达到每公斤/小时20毫升。
生产线	液体

105.

产品	磷酸钠直肠溶液
活性成分的浓度	磷酸二干性钠 0.06g/mL + 单碱性磷酸钠 0.16g/mL 注意：报告体积应在100-133毫升之间。药物的主要包装必须为管状，颈部狭窄，底部平坦，并配有直肠给药装置。应检查给药装置的尺寸和厚度，以确保药物给药的路径。
同义词	磷酸钠灌肠
药品形式	直肠溶液
适应症	泻药
如何使用	成人使用。 外部（直肠）使用。 单剂量呈现。使用前，取下直肠导管的保护罩。罐子抬起时，用手指托住有凹槽的盖子。另一只手握住保护盖，轻轻取下。从以下描述的姿势中选择最方便的： 左侧：侧卧，膝盖屈曲，手臂放松。 膝胸：跪下，然后将头部和胸部向前压下，直到脸部左侧贴在表面，使手臂保持舒适的位置。 自我管理：最简单的方法是躺在毛巾上。用力轻轻将导管插入直肠，压缩小瓶直到几乎所有液体排出。取出直肠上的导管。必须把瓶子里的水倒出来。保持这个姿势，直到你感到强烈的排便冲动（通常2到5分钟）。 注意：必须在标签或说明书中插入说明上述药物施用各位置的图表。
警告	药物禁用于患有充血性心力衰竭、肾衰竭、肝衰竭、动脉高压、阑尾炎、肠梗阻、溃疡性结肠炎及对任何成分过敏的患者。 不应在出现恶心、呕吐或腹痛的情况下使用。 不良反应：高磷血症（血液中磷过多）、高钠血症（血液中钠过多）、低钾血症（血液钾含量过低）、代谢性酸中毒和纤维素。 对于脱水或虚弱患者，应仔细确定所用溶液的体积.由于这是一种高渗溶液，使用可能导致病情加重。 应确保在给药后将肠道内容物排出。如果没有发生这种情况，请寻求医疗帮助。 应避免短时间内反复使用。
生产线	液体

106.

产品	1%硫酸铜和3.5%硫酸锌的溶液
活性成分的浓度	硫酸铜 10 mg/mL（1%），硫酸锌 35 mg/mL（3.5%）
同义词	Água d'alibour，铜层岩
药品形式	解决方案
适应症	皮肤伤口的治疗中使用防腐剂。
如何使用	外部使用。 纯水或稀释水，适用于局部应用。
警告	注意事项：将瓶子紧闭，远离光线。注意眼睛和黏膜。不要摄入。如果是误食，请寻求医疗帮助。
生产线	液体

107.

产品	硫酸镁晶体
活性成分的浓度	最低99%硫酸镁
同义词	苦盐
药品形式	火药
适应症	泻药
剂量	成人和儿童使用（超过2年）。 成人：5至30克（1茶匙至2汤匙）。 儿童：每公斤体重0.1至0.25克。 早餐前，建议用250毫升过滤水饮用推荐量，最好空腹饮用。
警告	禁忌症：慢性肠梗阻、克罗恩病、溃疡性结肠炎或肠道炎症发作的病例;适用于肾功能障碍患者和肠道寄生虫病儿童。 持续使用可能导致慢性腹泻和电解质失衡。 每天不要超过推荐剂量，且使用时间不得超过2周。
生产线	实心

108.

产品	硫酸钠溶液 17.5%
活性成分的浓度	175 mg/mL
同义词	硫酸钠泻盐柠檬水
药品形式	解决方案
适应症	泻药
剂量	空腹服用100毫升，纯水或沸水稀释，或由医生自行决定。 打开后，将瓶子紧闭在冰箱中。
警告	禁忌症：适用于慢性肠梗阻、克罗恩病、溃疡性结肠炎及肠道炎症发作。 注意事项与警示：使用泻药完成完整排便后，可能需要几天的空档才能恢复正常排便，这不应与便秘混淆。 过量使用泻药可能导致脱水、电解质流失和肠道溃疡等不良反应。
生产线	液体

109.

产品	硫酸钠
活性成分的浓度	最低含98%硫酸钠
同义词	格劳伯盐
药品形式	火药
适应症	泻药
剂量	成人和儿童使用超过2年。 通常剂量为每天15克（1汤匙），用煮沸或过滤水中。
警告	禁忌症：慢性肠梗阻、克罗恩病、溃疡性结肠炎及肠道炎症发作时;适用于肾功能障碍患者和肠道寄生虫病儿童。 持续使用可能导致慢性腹泻和电解质失衡。每天不要超过推荐剂量，且使用时间不得超过2周。
生产线	实心

110.

产品	硫酸亚铁
活性成分的浓度	40毫克元素铁
同义词	铁
药品形式	平板或涂层平板
适应症	协助缺乏性贫血。
剂量	成人使用。 每天口服1片，空腹服用。
警告	注意事项：肝病患者、消化性溃疡、胃溃疡或十二指肠溃疡、酗酒、肾衰竭、对配方奶成分过敏的患者。 应避免使用超过6个月的铁剂。 接受输血和静脉输铁的患者不应使用溶血性贫血。 不良反应：便秘、腹泻、粪便颜色深、恶心、腹痛、呕吐、胃灼热、粪便出血、牙齿变暗、喉咙刺激、尿液变暗、铁质积聚（组织中铁质积累）。
生产线	实心

111.

产品	硫酸亚铁
活性成分的浓度	60毫克元素铁
同义词	铁
药品形式	平板或涂层平板
适应症	协助缺乏性贫血。
剂量	成人使用。 每天口服1片，空腹服用。
警告	注意事项：肝病患者、消化性溃疡、胃溃疡或十二指肠溃疡、酗酒、肾衰竭、对配方奶成分过敏的患者。 应避免使用超过6个月的铁剂。 接受输血和静脉输铁的患者不应使用溶血性贫血。 不良反应：便秘、腹泻、粪便颜色深、恶心、腹痛、呕吐、胃灼热、粪便出血、牙齿变暗、喉咙刺激、尿液变暗、铁质积聚（组织中铁质积累）。
生产线	实心

112.

产品	硫酸亚铁
活性成分的浓度	25mg/mL 元素铁
同义词	铁
药品形式	口腔溶液
适应症	协助缺乏性贫血。
剂量	成人使用。 12岁以上及成年人：每天服用4毫升。 儿童用法。 6个月至18个月的儿童：每周服用1毫升;18个月至6岁儿童：每天服用1毫升;6至12岁儿童：每天服用2毫升。 注意：如适用，请根据产品特性告知剂量的滴剂等效性。
警告	注意事项：肝病患者、消化性溃疡、胃溃疡或十二指肠溃疡、酗酒、肾衰竭、过敏患者。 应避免使用超过6个月的铁剂。 接受输血和静脉输铁的患者不应使用溶血性贫血。 不良反应：便秘、腹泻、粪便颜色深、恶心、腹痛、呕吐、胃灼热、粪便出血、牙齿变暗、喉咙刺激、尿液变暗、铁质积聚（组织中铁质积累）。
生产线	液体

113.

产品	甘油栓剂
活性成分的浓度	注意：甘油摄入量取决于年龄组：婴儿栓剂：1克模具 儿童栓剂：1.5至2.0克模具 成人栓剂：2.5至3克霉菌。
药品形式	栓剂
适应症	泻药
如何使用	栓剂可在插入前用水润湿。 将栓剂从最薄的直肠插入。 甘油栓剂可以放置15到30分钟。产品不必完全溶解才能产生预期效果。
警告	对配方中任何成分过敏。
生产线	实心

114.

产品	薄荷滑石粉
活性成分的浓度	薄荷 0.01克/克（1%）
药品形式	火药
适应症	皮疹，瘙痒。
如何使用	外部使用。 每天涂抹两到三次，涂抹在受影响部位。
警告	作时要小心：避免吸入。它可能引发从刺激到更严重的肺部损伤等各种症状。
生产线	实心

115.

产品	替苯达唑
活性成分的浓度	50毫克/克
药品形式	乳膏或软膏
适应症	幼虫*迁移*（地理性病）皮肤感染和疥疮的治疗
如何使用	外部使用。 成人和儿童使用。 建议在使用产品前用肥皂清洗受影响部位。 幼*虫迁徙*虫的治疗：施药量应足够，均匀地以圆周运动均匀分布于受影响表面，每天三次，持续五天。它可以用于头皮、头发及身体的其他毛发区域。涂抹后无需用纱布或胶粘剂覆盖受影响区域。涂抹后的最初几个小时内，建议不要在现场清洗或使用任何乳膏、软膏或化妆水。 疥疮治疗：晚上洗热水澡，迅速擦干皮肤，轻轻涂抹产品在受影响区域及周围区域。第二天早上，重新洗个澡，然后再涂上产品。治疗应重复5天。治疗期间，身体和床上的衣物应清洗并熨烫。如果同一家庭中还有其他疥疮患者，应同时治疗以防止再次感染。
警告	不应涂抹在眼睛和黏膜上。 皮肤可能会出现刺激、灼烧和脱落，这种情况下应停止使用。 不要摄入。服用噻苯达唑化妆水可能引起胃肠道症状，如恶心、呕吐、腹泻、视觉障碍和心理变化。 孕妇和哺乳期母亲不使用。
生产线	半固态

116.

产品	替苯达唑
活性成分的浓度	50 mg/mL
药品形式	乳液（化妆水）
适应症	幼*虫迁徙*虫（地理性病）和疥疮（疥疮）皮肤感染的治疗。
如何使用	外部使用。 成人和儿童使用。 建议在使用产品前用肥皂清洗受影响部位。 幼*虫迁徙*虫的治疗：施药量应足够，均匀地以圆周运动均匀分布于受影响表面，每天三次，持续五天。它可以用于头皮、头发及身体的其他毛发区域。涂抹后无需用纱布或胶粘剂覆盖受影响区域。涂抹后的最初几个小时内，建议不要在现场清洗或使用任何乳膏、软膏或化妆水。 疥疮治疗：晚上洗热水澡，迅速擦干皮肤，轻轻涂抹产品在受影响区域及周围区域。第二天早上，重新洗个澡，然后再涂上产品。治疗应重复5天。治疗期间，身体和床上的衣物应清洗并熨烫。如果同一家庭中还有其他疥疮患者，应同时治疗以防止再次感染。
警告	不应涂抹在眼睛和黏膜上。 皮肤可能会出现刺激、灼烧和脱落，这种情况下应停止使用。 不要摄入。服用噻苯达唑化妆水可能引起胃肠道症状，如恶心、呕吐、腹泻、视觉障碍和心理变化。 孕妇和哺乳期母亲不使用。
生产线	液体

117.

产品	替苯达唑
活性成分的浓度	50毫克/克
药品形式	肥皂
适应症	用于治疗*迁徙幼虫*和疥疮
如何使用	外部用途 成人及儿童用途 用肥皂彻底清洗受影响部位，直到产生足够的泡沫。让泡沫干了，用水冲洗后晾干。然后涂抹噻苯达唑化妆水、乳膏或软膏。
警告	不应涂抹在眼睛和黏膜上。 皮肤可能会出现刺激、灼烧和脱落，这种情况下应停止使用。 不要摄入。服用噻苯达唑化妆水可能引起胃肠道症状，如恶心、呕吐、腹泻、视觉障碍和心理变化。 孕妇和哺乳期母亲不使用。
生产线	固体

118.

产品	龙胆紫溶液
活性成分的浓度	Violeta genciana 10 mg/mL（1%） 紫龙胆 20 mg/mL（2%）
同义词	六甲基丙噻林氯化物溶液
药品形式	解决方案
适应症	念珠菌病（念珠菌感染）、脓疱病、浅表感染、慢性和刺激性病变及皮炎时使用消毒剂。 抗真菌作用于冻疮和香港脚患者。
如何使用	外部使用。 在之前清洁过的局部涂抹。
警告	注意事项与警告：请短时间使用，3-4天。持续使用可能导致刺激。不要在面部病变上使用，因为可能会造成永久性污渍。 不要摄入。
生产线	液体

出版日期，2021年11月12日 - 第1部分

[退休，2021年11月29日 - 第1区]

本文本不取代官方出版物。